

תרכיב לחתולים

תיאור:

תרכיב חי מיובש בהקפאה בצורת תרחיף להזרקה לאחר המסתו בעזרת הממס המצורף.

הרכב:

מנה של 1 מ"ל של תרכיב מומס מכילה חומר פעיל:

נגיף חי מוחלש של $feline\ calicivirus, strain\ F9 \geq 4.6 \log_{10} PFU$

נגיף חי מוחלש של $feline\ herpes\ virus\ type\ 1, strain\ G2620A \geq 5.2 \log_{10} PFU$

נגיף חי מוחלש של $feline\ panleucopenia\ virus, strain\ MW-1 \geq 4.3 \log_{10} CCID50$

1PFU: Plaque-Forming Units 2CCID50: Cell Culture Infective Dose 50%

התוויות:

לעורר חיסוניות פעילה בחתולים על מנת:

- להפחית סימנים קליניים בעקבות הדבקה בקליציוירוס (FCV) ונגיף הרפס 1 (FHV).
- למנוע סימנים קליניים של נגיף פאנלויקופניה (FPLV), לויקופניה, והפרשת הנגיף לסביבה.

תחילת החסינות:

4 שבועות לאחר ביצוע החיסון עבור FCV ו-FHV.

3 שבועות עבור FPLV.

משך חסינות:

עבור FCV ו-FHV - שנה.

עבור FPLV - 3 שנים.

אופן השימוש והמינון:

יש להשתמש ב-1 מ"ל מהממס המצורף על מנת להמיס את התרכיב המיובש בהקפאה בבקבוקון ליצירת מנת חיסון אחת. יש לתת לתרחיף המומס להגיע לטמפר' החדר (15-25°C), ולהזריק 1 מ"ל מהתרכיב עבור כל חתול, במתן תת עורי. יש להשתמש במזרק ומחט סטריליים, נקיים מחומרי חיטוי. יש להשתמש בתרחיף המומס תוך 30 דקות מרגע הכנתו.

תוכנית חיסונים:

חיסון בסיסי: מתן של שתי מנות בהזרקה תת-עורית בהפרש של 3-4 שבועות בין המנות. את המנה הראשונה יש לתת החל מגיל 8-9 שבועות לחיי הגור. את המנה השנייה יש לתת החל מגיל 12 שבועות.

חיסון חוזר: יש לתת מנה בודדת (1 מ"ל) לפי ההמלצה הבאה: עבור חיסוניות נגד קליציוירוס (FCV) והנגיף הרפס 1 (FHV) type 1, יש לחזור על החיסון פעם בשנה (בהנחה שהתרכיב מכיל את הזנים strain F9, strain G2620A, כמו תרכיב זה). עבור נגיף פאנלויקופניה (FPLV), יש לחזור פעם בשלוש שנים (בהנחה שהתרכיב מכיל את הזן strain MW-1, כמו תרכיב זה).

זמן המתנה: לא רלוונטי.

התוויות נגד ואזהרות:

- יש לחסן חתולים בריאים בלבד.
- נוגדנים אימהיים העשויים להמציא עד גיל 12-9 שבועות, עלולים להשפיע לרעה על יעילות החיסון, ובגורים אלו יתכן כי ביצוע החיסון לא ימנע לחלוטין הופעת סימנים קליניים לויקופניה והפרשת הנגיף לאחר הדבקה ב-FPLV. לכן במקרים בהם צפויים להמציא נוגדנים אימהיים גבוהים, יש לשנות את תוכנית החיסונים בהתאם.
- אין לערבב עם מוצרים וטרינריים רפואיים אחרים.
- אין מידע זמין על בטיחות ויעילות של שימוש בתרכיב זה במקביל לשימוש במוצר וטרינרי רפואי אחר. על כן, ההחלטה על שימוש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש במוצר וטרינרי רפואי אחר, צריכה להתקבל לגופו של עניין עבור כל מקרה.

שימוש במהלך הריון והנקה:

אין להשתמש במהלך הריון והנקה, מכיוון שהתרכיב לא נבדק על חתולות הרות או מניקות. נגיף חי של פאנלויקופניה עלול לגרום לבעיות במערכת הרבייה של החתולה ולמומים בעוברים.

אזהרות לאדם:

- לשימוש וטרינרי בלבד.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית. במקרה של הזרקה בשוגג, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית עם אריזת המוצר ולהציג עלון או תווית התרכיב לרופא המטפל.

תופעות לוואי:

נפיחות קלה וכואבת עלולה להופיע למשך 1-2 ימים באיזור ההזרקה בעור. תתכן עליה קלה בחום הגוף (עד 40°C), למשך 1-2 ימים. לעיתים, עד יומיים לאחר החיסון, ניתן לצפות לשינויים, התעטשויות, הפרשות מהאף, מעט אפטיות, או ירידה בתיאבון. במיקרים נדירים החיסון עלול לגרום לרגישות יתר (גרד, קשיי נשימה, הקאות שלשול ואף התמוטטות).

מנת יתר:

במינון פי עשר, נפיחות קלה וכואבת עלולה להופיע באיזור ההזרקה למשך 10-4 ימים. עליה בטמפרטורת הגוף (עד 40.8°C) נצפתה למשך 1-2 ימים. במקרים מסוימים יתכנו אי נוחות כללית, שיעולים, התעטשויות, עייפות חולפת וירידה בתיאבון למשך מספר ימים לאחר המתן.

חומרים בלתי פעילים:

Disodium phosphate dehydrate, Hydrolysed gelatine, Pancreatic digest of casein and Sorbitol.

ממס:

Disodium phosphate dehydrate, Potassium dihydrogen phosphate and Water for injection.

חיי מדף:

תרכיב:

בקבוקונים מקוריים סגורים ושומרים בטמפר' 2-8°C: 33 חודשים.

ממס: 5 שנים.

לאחר הכנה: יש להשתמש תוך חצי שעה.

תנאי אחסון:

יש לאחסן את התרכיב בטמפר' של 2-8°C. יש להימנע מחשיפה לאור.

יש לאחסן את המודל (טרם הפתיחה וההכנה) בטמפר' נמוכה מ-25°C. אין להקפיא. יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

אריזה:

תרכיב: בקבוקוני זכוכית סוג I בתכולה של מנה יחידה, סגורים בעזרת פקק גומי halogenobutyl, ואטומים במכסה אלומיניום מוצפן, בליווי בקבוקונים של מדלל סטרילי, סגורים בעזרת פקק גומי halogenobutyl, ואטומים במכסה אלומיניום מוצפן.

גודל אריזה: אריזת קרטון המכילה 5, 10, 25 או 50 בקבוקוני תרכיב וממס. לא כל גדלי האריזות משווקים.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי. מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פסולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות המקומיות.

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבור 35, בוקסמר AN 5831, הולנד.

יבואן:

וונטרקט שיווק בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם 6085001.