

לשימוש וטרינרי בלבד

שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים

לשימוש בבעלי חיים בלבד

CANINE 1-DAPPvL2® נוביווק

NOBIVAC® CANINE 1-DAPPvL2

תרכיב מיובש בהקפאה, ולאחר המסתו בעזרת הממס המצורף – תרחיף להזרקה.

25 בקבוקונים של 1 מנה

תרכיב עבור כלבים.

תיאור: כל בקבוקון מכיל מנה אחת של תרכיב להרחפה, כל מנת תרכיב מכילה את הנגיפים החיים המיובשים בהקפאה: Distemper-Adenovirus Type 2-Parainfluenza-Parvovirus (דיסטמפר, אדנו-וירוס סוג 2, פארא-אינפלואנזה ופרוו-וירוס) בשילוב עם בקטרין בלתי פעיל של *Leptospira Canicola-Icterohaemorrhagiae* (לפטוספירה קניקולה ו-איכטרהמורג'יאה).

כל בקבוקון ממס (nobivac diluent) מכיל מים להזרקה מסוג phosphate buffered water.

הרכב:

מנה אחת של תרכיב מכילה:

• חומרים פעילים:

Canine Distemper virus (CDV) Distemperoid strain	$\geq 10^{3.7}$ TCID ₅₀
Canine Adenovirus type 2 (CAV-2) Ditchfield strain	$\geq 10^{4.8}$ TCID ₅₀
Canine Parvovirus (CPV) SAH-CPV-2b strain	$\geq 10^{5.1}$ TCID ₅₀
Canine Parainfluenza virus (CPI) CPI-PR strain	$\geq 10^{4.3}$ TCID ₅₀
<i>Leptospira canicola</i> (LC) LC-NY strain	≥ 80 hamster PD ₈₀
<i>Leptospira icterhaemorrhagiae</i> (LI) LI-11403 J strain	≥ 80 hamster PD ₈₀

התוויות:

סיוע במניעת תחלואה הנגרמת ע"י: נגיף הכלבלבת, נגיף הפרוו, נגיף הפארא-אינפלואנזה, נגיפי האדנו-וירוס סוג 1 (דלקת כבד) וסוג 2 (מחלה נשימתית), חיידק הלפטוספירה מזני קניקולה ואיכטיוהמורג'יאה.

Canine Distemper virus, Adenovirus type 1, Adenovirus type 2, Canine Parvovirus, Parainfluenza virus, leptospirosis - *L. canicola*, *L. icterhaemorrhagiae*

התוויות נגד : אין לחסן כלבות הרות.

אזהרות מיוחדות לשימוש :

השימוש במוצרים ביולוגים עלול לגרום לשוק אנפילקטי או תגובת רגישות יתר של מערכת החיסון, טיפול נוגד: אנטיהיסטמין, קורטיקוסטרואידים, ואדרנלין הם המומלצים לשימוש, תלוי בטיבה וחומרתה של תגובת היתר.
הגיל של גורי הכלבים שבו הנוגדנים האימהיים כנגד פרוו-וירוס אינם מפריעים יותר להשראת חיסוניות פעילה, משתנה ותלוי ברמת הנוגדנים (טייטר) שמצויה בדם האם, וכן בכמות הנוגדנים שספגו הגורים בקולוסטרומ.
התרכיב מכיל ג'נטמיצין וטימרוסול כחומרי שימור.

הוראות מיוחדות לשימוש בבע"ח :

השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הוטרינר המטפל, מתוך היכרותו עם ההיסטוריה ומצבו הבריאותי של בעל החיים.
יש לחסן כלבים בריאים בלבד, שאינם נגועים בטפילים.
יש להשתמש במחט ומזרק סטריליים חדשים, ללא כימיקלים.

תופעות לוואי:

בעת ההזרקה עלול להיגרם כאב, אשר אמור לחלוף ממספר שניות עד חמש דקות לאחר ההזרקה.
לאחר ביצוע החיסון, נפיחות קלה וחולפת (לעיתים כואבת) עלולה להופיע באזור ההזרקה.
במקרים נדירים עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר (אנפילקסיס), חום, עייפות, התנפחות הפנים, הקאות או שלשולים עלולים להופיע זמן קצר לאחר הזרקת התרכיב.

מידע המצביע על התפתחות עכירות קרנית אינו קשור לתרכיב זה.

שימוש במהלך הריון והנקה:

אין לחסן כלבות הרות.

מינון, הוראות שימוש ודרך המתן:

העבר את תכולת הממס הסטרילי אשר בבקבוקון המצורף אל תוך הבקבוקון המכיל את התרכיב בצורה א-ספטית, ערבב בעדינות עד המסה. השתמש מיד בתרכיב המורחף.
הזרק מנה אחת (1 מ"ל), תת עורית או תוך שרירית.

ניתן לתת את המנה הראשונה של התרכיב בגיל 6 שבועות או מאוחר יותר, יש לתת לפחות שתי מנות של התרכיב לשם התחסנות ראשונית ולכן יש לחזור על מתן התרכיב לאחר 4-2 שבועות, עד גיל 12 שבועות.
מומלץ לחזור על החיסון פעם בשנה ע"י מתן מנה אחת של התרכיב.

תגובות בין-תרופתיות:

לא ידוע

מנת יתר:

ללא סימנים מיוחדים.

אזהרות פרמצבטיות:

אין לערבב עם תרכיבים אחרים.

חומר משמר : Gentamicin and Thimerosal

חיי מדף:

תרכיב מיובש בהקפאה – 18 חודשים.

תרכיב שעבר המסה ע"י ממס - יש להשתמש מיד.

הוראות אחסנה :

יש לאחסן את התרכיב בקירור בטמפ' של 2-8 °C, להמנע מחשיפה לאור, אין להקפיא.

אריזה:

תרכיב - בקבוקוני זכוכית סוג I בתכולה של מנה יחידה סגורים בעזרת פקק גומי halogenobutyl, ואטומים במכסה אלומיניום מוצפן.
ממס מימי – בקבוקוני זכוכית או פלסטיק המכילים 1 מ"ל, סגורים בעזרת פקק גומי halogenobutyl, ואטומים במכסה אלומיניום מוצפן.
צעדים מיוחדים להשלכת של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי. על מוצרים רפואי שלא נעשה בהם שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי להיות מושלך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

אזהרות לאדם:

1. לשימוש וטרינרי בלבד.
2. הרחק מהישג ידם של ילדים.
3. המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
4. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
5. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
6. במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תוויית התרכיב.

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

יבואן:

ווטמרקט שיווק בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם, 6085001.