

לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

נוביווק די.אי.צ' פי

NOBIVAC® DHP

תרכיב לשימוש בכלבים, תמיסה להזרקה

תכולה : 10 בקבוקים של מנה אחת ו/או ממיס / 50 בקבוקים של מנה אחת ו/או ממיס.

הרכב:	
חומר פעיל:	כל מנה של 1 מ"ל תרכיב מהול מכיל:
Canine distemper virus, strain Onderstepoort	$\geq 10^{4.0} \text{TCID}_{50}$
Canine adenovirus 2, strain Manhattan LPV3	$\geq 10^{4.0} \text{TCID}_{50}$
Canine parvovirus, strain 154	$\geq 10^{7.0} \text{TCID}_{50}$
Phosphate buffered saline	ממיס: 1 מ"ל לבקבוק;
Gelatin	חומר לא פעיל :
Sorbitol	
Pancreatic digest of casein	
Disodium phosphate dehydrate	
Potassium dihydrogen phosphate	
Water for injection	

התוויות :

השראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים על מנת לייצר נוגדנים ולהפחית סימנים קליניים של מחלה הנגרמת על ידי זיהום בנגיף הכלבלב, למנוע סימנים קליניים והפרשה נגיפית הנגרמים על ידי נגיף parvo, להפחית סימנים קליניים של דלקת כבד מדבקת והפרשה נגיפית הנגרמת על ידי adenovirus 1 ולצמצם את הסימנים הקליניים של זיהום בדרך נשימה והפרשה נגיפית הנגרמים על ידי adenovirus 2 .

רכישת חסינות: תוך 7 ימים.

משך החסינות: 3 שנים.

התוויות נגד: אין.

מינון ודרך מתן:

מנה אחת להזרקה תת עורית לכלבים.

יש להמייס תכולת בקבוק אחד ב-1 מ"ל של ממיס מייד לפני השימוש.

יש לבצע חיסון באמצעות מחט ומזרק סטריליים. יש למנוע מגע של החיסון עם חומרי חיטוי כימיים. אין לחטא את העור עם חומרי חיטוי כימיים טרם מתן החיסון.

מתן חיסון ראשוני:

הזרקה מנה אחת של התרכיב מספקת חיסון פעיל בכלבים בני 10 שבועות ומעלה.

כאשר נדרש חיסון מוקדם יותר ניתן לתת חיסון ראשון בגיל 6 שבועות, אך לאור נוכחותם של נוגדנים אמהיים שעלולים להשפיע על רמת החיסון, יש לחזור ולתת מנה נוספת 2-4 שבועות לאחר מכן (בגיל 10 שבועות או יותר).

תוכנית חיסונים חוזרת:

כל כלב שקיבל חיסון ראשוני בגיל 6 שבועות צריך לקבל מנה נוספת 2-4 שבועות לאחר מתן החיסון הראשוני.

יש לתת מנת דחף כל 3 שנים.

שימוש במהלך הריון, הנקה או ייחום:

ניתן להשתמש בכלבות בהריון אשר חוסנו בעבר ב-CDV (strain Onderstepoort), CAV2 (strain Manhattan LPV3) ו-CPV (strain 154) נוגדנים הכלולים בחיסונים מסדרת Nobivac .

תופעות לוואי:

לאחר חיסון בתרכיב או לאחר מתן חיסון ביחד עם תרכיב לפטוספירוזיס של Nobivac: באתר הזריקה עלולה להתפתח נפיחות בקוטר של עד 5 מ"מ. לעיתים נפיחות זו

עלולה להיות נוקשה וכואבת לתקופה של עד 3 ימים ממועד ההזרקה.

לאחר חיסון בתרכיב ביחד עם תרכיב נגד מחלת הכלבת של Nobivac: באתר ההזרקה עלולה להתפתח נפיחות בקוטר של 1-4 ס"מ. הנפיחות עלולה להופיע למשך 3 שבועות לאחר החיסון. בנוסף הנפיחות עלולה לכאוב במשך 3 ימים לאחר מתן החיסון.

במקרים נדירים ייתכנו עלייה בטמפרטורת הגוף ותגובת רגישות יתר חריפה (אנפילקסיס) עם סימנים שעשויים לכלול עייפות, בצקת פנים, גרד, קוצר נשימה, הקאות, שלשול או קריסה. תופעות אלה עלולות להתרחש זמן קצר לאחר חיסון.

תגובות בין תרופתיות:

אין מידע לגבי היעילות והבטיחות של התרכיב בשימוש עם תכשירים וטרינריים אחרים למעט שילוב עם הבאים:

ניתן לשלב תרכיב זה ביחד עם תרכיב נגד לפטוספירוסיס (strain 820K,Ca-12-000) ו/או תרכיב נגד מחלת הכלבת (Pasteur RIV) של Nobivac ו/או תרכיב נגד ברונקיטיס נגיפית (B. bronchiseptica strain B-C2) ונגד נגיף פרא-אינפלוינצה (strain Cornell) מסדרת Nobivac. החלטה על מתן תרכיב Nobivac DHP לפני או אחרי מתן תרכיבים אחרים תינתן בכל מקרה לגופו ועל סמך היכרותו של הרופא המטפלת עם ההיסטוריה ובמצבו הבריאותי של הכלב.

אזהרות:

1. יש לחסן כלבים בריאים בלבד.
 2. יש להימנע מחשיפת כלבים מחוסנים לזיהומים בשבוע הראשון שלאחר מתן החיסון.
- זן נגיף הפרבווירוס (parvovirus) בתרכיב עלול להיות מופץ ברמה נמוכה ביותר במהלך עד 8 ימים לאחר מתן התרכיב (תופעת Shedding). עם זאת אין עדויות לכך שתופעה זו יכולה לגרום להופעת סימנים קליניים בחיות שטרם חוסנו ועברו הדבקה כתוצאה מתופעת הפצה זו.

אזהרות לאדם:

3. לשימוש ווטרינרי בלבד.
4. הרחק מהישג ידם של ילדים.
5. המנע מהזרקה עצמית.
6. במקרה של הזרקה עצמית יש לשטוף את המקום מיד במים. במקרה של התפתחות תופעות לוואי, יש לגשת לטיפול רפואי ולהציג את העלון ו/או התווית.

מינון יתר:

מינון יתר בשוגג אינו עשוי לגרום תגובות שונות מאלה שמפורטות בסעיף תופעות לוואי.

הוראות אחסנה:

יש להגן מפני אור ולאחסן בטמפרטורה של 2°C - 8°C . אין להקפיא. אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על הבקבוק.

חיי מדף לאחר פתיחה:

יש להשתמש בתרכיב תוך 30 דקות ממועד המיהול.

האריזה:

בקבוק זכוכית סוג I חד מנתי סגור עם פקק גומי ואטום באמצעות מכסה אלומיניום. אריזת הקרטון כוללת 10 או 50 בקבוקים חד מנתיים. המדלל יכול להגיע ארוז ביחד עם התרכיב או באריזה נפרדת.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:

מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יצרן: אינטרווט אינטרנשיונל בי. וי., וים דה קורברסטרט 35, בוקסמר 5831, הולנד

יבואן ומשווק: ווטמרקט שיווק בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם ישראל, 6085001. טל': 03-9393000