

לשימוש וטרינרי בלבד
שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים
לשימוש בבעלי חיים בלבד

NOBIVAC® KC נוביווק® KC

תרכיב המכיל
Bordetella bronchiseptica -i Canine parainfluenza
(נגיף הפרה-אינפולאנזה וחיידק הבורדטלה ברונכיספטטיקה)
מיובשים בהקפאה

תכולה : 5 בקבוקוני תרכיב + 5 בקבוקוני ממס מימי
מיועד לכלבים

הרכב:

מנה של 0.4 מ"ל של תרכיב מומס מכילה:

חומרים פעילים:

$\leq 10^{8.0}$ CFU, Bordetella bronchiseptica חי מזן B-C2
 $\leq 10^{3.0}$ TCID₅₀, Canine parainfluenza חי מזן Cornell

בבקבוקון הממס (nobivac diluent) מכיל מים להזרקה מסוג phosphate buffered water.

התרכיב מכיל חיידק חי בורדטלה ברונכיספטטיקה זן B-C2 ונגיף חי פרה-אינפולאנזה זן קורנל.

התרכיב גורם להתפתחות של הגנה חיסונית פעילה כנגד שעלת המכלאות בכלבים על ידי השריית יצור נוגדנים כנגד חיידק הבורדטלה ברונכיספטטיקה ונגיף הפרה-אינפולאנזה.

אופן השימוש, מינון והתוויה:

התוויה: עירור הגנה חיסונית פעילה בכלבים כנגד חיידק הבורדטלה ברונכיספטטיקה ונגיף הפרה-אינפולאנזה לשם מניעה של שעלת המכלאות.

תחילת ההתפתחות של ההגנה החיסונית: החל מ- 72 שעות לאחר מתן התרכיב עבור Bordetella Bronchiseptica, והחל מ- 3 שבועות עבור Canine Parainfluenza. משך ההגנה החיסונית: שנה.

התוויות נגד ואזהרות:

- יש לחסן כלבים בריאים בלבד.
- יש לבצע בדיקה קלינית מתאימה טרם מתן התרכיב.

תופעות לוואי:

הפרשה קלה מהעין או הנחיר עלולה להופיע יום לאחר מתן התרכיב, לעיתים בליווי חירחורים, התעטשויות ו/או שיעולים, במיוחד בגורים צעירים ורגישים. סימנים אלו לרוב חולפים, אך במקרים מסוימים הם יכולים להמשיך עד 4 שבועות. בכלבים המבטאים סימנים קליניים חריפים מאלו, יש לטפל באנטיביוטיקה מתאימה.

אזהרות מיוחדות לשימוש:

אפשר לממס המימי המצורף להגיע לטמפר' החדר (15-25°C). נער היטב את הבקבוקון של התרכיב לאחר הוספת הממס. יש להשתמש בתרכיב תוך שעה מהכנתו.

שימוש במהלך הריון והנקה:

התרכיב נמצא בטוח לשימוש בכלבות בהריון.

תגובות בין תרופתיות:

אין לתת את התרכיב ביחד עם טיפול תוך נחירי אחר או במקביל לטיפול אנטיביוטי.

אופן המתן:

הרחף בצורה א-ספטית את התרכיב המיובש בהקפאה בעזרת הממס המצורף. לאחר שאיבת תכולת בקבוקון התרכיב, יש להסיר את המחס מהמזרק, לחבר לקצה המזרק את המוליך המצורף ולטפטף 0.4 מ"ל לנחיר אחד של הכלב.

תוכנית מתן חיסונים מומלצת: על הכלבים להיות לפחות בני שבועיים

מומלץ כי כלבים שלא קיבלו את התרכיב, יקבלו מנה אחת של התרכיב 3 שבועות לפני תקופת החשיפה לסיכון, לדוגמא: מכלאה/פנסיון זמני, על מנת לקבל הגנה מגורמי התחלואה אשר בתרכיב. על מנת לקבל הגנה מ-Bordetella Bronchiseptica על הכלבים לקבל מנה אחת של התרכיב 72 שעות לפני החשיפה לסיכון. יש לחזור על מתן התרכיב פעם בשנה.

מינון יתר:

במיוחד בגורים צעירים מאוד, סימנים של מחלות דרכי הנשימה העליונות עלולים להופיע לאחר מתן מינון יתר, הכוללים הפרשות אף ועיניים, דלקת גרון, עיטושים ושיעולים. הסימנים עלולים להופיע יום לאחר מתן התרכיב ולהימשך עד 4 שבועות.

אזהרות פרמצבטיות:

אין לערבב עם מוצרים אחרים.

חיי מדף:

בטמפר' של 2-8°C בצורתו המקורית - 27 חודשים. בתרכיב שעורבב עם הממס, יש להשתמש בתוך שעה.

הוראות אחסנה:

יש לאחסן את התרכיב והממס המצורף בטמפר' של 2-8°C.

האריזה:

בבקבוקוני זכוכית סוג I בתכולה של 3 מ"ל (מנה יחידה) או 10 מ"ל (5-10 מנות), סגורים בעזרת פקק גומי halogenobutyl ואטומים במכסה אלומיניום מוצפן, בליווי בבקבוקונים של מדלל סטרילי, ומוליכי פלסטיק לשם החדרת התרכיב לנחיר.

צעדים מיוחדים להשלכת אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פסולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

אזהרות לאדם:

- לשימוש וטרינרי בלבד.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתרכיב.
- במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תוויית התרכיב.

יצרן:

אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

יבואן ומשווק:

ווטמרקט שיווק בע"מ דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם 6085000. טלפון: 03-9393000