

לשימוש וטרינרי בלבד
שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים
לשימוש בבעלי חיים בלבד
NOBIVAC® LEPTO **נוביווק® לפטו**

תרכיב של חיידקי לפטוספירה, תרחיף להזרקה
תכולה: 10 בקבוקונים של 1 מנה

תרכיב עבור כלבים

הרכב:

חומר פעיל: כל מנה (1 מ"ל) של התרכיב מכילה חיידקי לפטוספירה אינטרוגנס (Leptospira interrogans) מומתים מהקבוצות הסרולוגיות:
Canicola strain Ca-12-000 ≥ 957 Units/ml
Icterohaemorrhagiae strain 820K ≥ 625 Units/ml

חומר משמר: תיאומרסל 0.01%

התוויות:

השראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים כנגד לפטוספירוזיס, הנגרמת ע"י לפטוספירה אינטרוגנס מהקבוצות הסרולוגיות Canicola ו-Icterohaemorrhagiae.
השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הרופא הוטרינר המטפל, מתוך היכרותו עם ההיסטוריה ומצבו הבריאותי של בעל החיים.

תוכנית מתן חיסונים מומלצת:

אופן המתן:

יש לערבב את הבקבוקון היטב טרם השימוש. יש להזריק בטכניקה אספטיית בהזרקה תת עורית של 1 מ"ל לכל חיה.

מתן חיסון ראשוני:

על כל הכלבים שטרם קיבלו את התרכיב, לקבל את התרכיב פעמיים במרווח של 2-4 שבועות. ניתן לתת את התרכיב לגורי כלבים החל מגיל 8 שבועות.

חזרתיות:

מדי שנה.

התוויות נגד ואזהרות:

- יש לחסן כלבים בריאים בלבד.
- יש לבצע בדיקה קלינית מתאימה טרם מתן התרכיב.

אזהרות טרם השימוש:

אפשר לתרכיב להגיע לטמפ' החדר (15-25°C) טרם השימוש. יש להשתמש בצידוד הזרקה סטרילי.

אזהרות לאדם:

- לשימוש וטרינרי בלבד.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
- במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

תופעות לוואי

מדי פעם עלולה להופיע תגובת רגישות יתר קלה, החולפת מעצמה. תגובה עורית מקומית קטנה בגודלה עלולה להופיע במהלך הימים הראשונים שלאחר מתן התרכיב.

שימוש במהלך הריון או הנקה:

התרכיב נמצא בטוח לשימוש בכלבות הרות.

תגובות בין תרופתיות:

ניתן להזריק את התרכיב Nobivac Lepto במקביל עם התרכיבים:

- Nobivac DHPPi
- Nobivac DHP
- Nobivac Puppy DP
- Nobivac Parvo C
- Nobivac Pi

ניתן להזריק את Nobivac Lepto באותו הזמן עם Nobivac Rabies אך באזור הזרקה שונה. אין מידע זמין לגבי בטיחות ויעילות תרכיב זה כאשר נעשה שימוש במקביל עם תכשירים רפואיים וטרינריים אחרים פרט לתכשירים המצוינים מעלה. ההחלטה האם להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש בתכשירים רפואיים וטרינריים אחרים צריכה להתקבל לפי כל מקרה לגופו.

מינון יתר:

ללא תופעות מיוחדות במינון כפול, שים לב כי התרכיב מגיע בבקבוקונים של מנה אחת.

תאימות:

אל תערבב תרכיב זה עם אף מוצר רפואי וטרינרי אחר למעט תרכיבים מסדרת Nobivac הרשומים למעלה.

חיי מדף:

לפני הפתיחה, 24 חודשים אם נשמר בקירור בטמפ' 2-8°C. לאחר הפתיחה של הסוגר, יש להשתמש בתרכיב באותו יום.

הוראות אחסנה:

אחסן במקום חשוך בקירור בטמפ' 2-8°C, אין להקפיא.

האריזה:

קופסא המכילה 10 בקבוקוני זכוכית הסגורים במכסה אלומיניום ובפקק גומי.

צעדים מיוחדים להשלכת אריזות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר רפואי וטרינרי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

יבואן ומשווק:

ווטמרקט שיווק בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם 6085001. טלפון 03-9393000