

לשימוש ווטרינרי בלבד

לשימוש בחזירים בלבד

**Porcilis PCV**

**פורסיליס® פי סי וי**

**תחליב להזרקה בחזירים**

**תכולה:** קופסת קרטון המכילה 1 או 10 בקבוקונים של 20, 50, 100, 200 או 500 מ"ל (10, 25, 50, 100 או 250 מנות).

**הרכב:** כל מנה של 2 מ"ל מכילה:

Porcine circovirus type 2 (PCV2) ORF2 subunit antigen: at least 4.5 log<sub>2</sub>ELISA units

(כפי שנקבע בבדיקת פוטנטיות in-vivo בתרנגולות).

אדג'ובנט:

25 mg dl-α-tocopheryl acetate

346 mg light liquid paraffin

תחליב להזרקה בעל צבע לבן בוהק, עם משקעים חומים הניתן להרחפה חוזרת.

#### **התוויה:**

לחיסון פעיל של חזירים על מנת להוריד עומס נגיפי בדם וברקמה לימפואידית ולהורדת תמותה ואיבוד משקל הקשורים עם זיהום PCV2 בתקופת ההשמנה.

תחילת החסינות: 2 שבועות

משך החסינות: 22 שבועות

**התווית נגד:** אין.

#### **תופעות לוואי:**

תופעות לוואי חולפות מקומיות יתכנו לאחר הזרקה בעיקר בצורה של נפיחות (בקוטר של עד 10 ס"מ) קשה, חמה ולפעמים כואבת. תופעות אלו חולפות בעצמן באופן ספונטני תוך 14-21 יום ללא השלכות קשות על מצב הבריאות הכללי של החיה.

רגישות יתר עלולה להתרחש לאחר החיסון, אשר גורמת לסימפטומים נזירולוגים קלים כמו רעידות ו/או עירור. תופעות אלו חולפות תוך מספר דקות ללא צורך בטיפול.

עליה חולפת בטמפרטורת הגוף של 1°C, עלולה להתרחש עד יומיים לאחר החיסון. תתכן עלייה בטמפרטורה הרקטלית של עד 2.5°C הנמשכת 24 שעות.

חזירונים מסוימים עלולים להראות סימני דיכאון וצריכת מזון מופחתת עד 5 ימים מהחיסון.

החיסון עלול לגרום לפגיעה חולפת בקצב הגדילה בתקופה המידית לאחר מתן התרכיב.

**במקרים נדירים מאוד עלולות להתרחש תגובות מסוג אנפילקטי, העלולות להוות מסכנת חיים. במקרה של תגובות כאלה, ייתכן שיהיה צורך בטיפול.**

אם אתה מבחין בתופעות לוואי קשות או תופעת לוואי נוספות שלא הוזכרו בעלון זה, אנא פנה לווטרינר המטפל.

**מין מטרה:** חזירים.

#### **מינון ודרך מתן:**

מנה אחת (2 מ"ל), דרך הזרקה תוך-שרירית (I.M) בצוואר באזור שמאחורי האוזן, לפי הלוח זמנים הבא:

במקרה של רמות נמוכות עד בינוניות של נוגדנים אימהיים (MDA) כנגד PCV2 מומלצת מנה יחידה של חיסון (2 מ"ל) לחזירים מגיל 3 שבועות ולמעלה.

כאשר צפויה הימצאות רמות גבוהות של נוגדנים אימהיים (MDA) כנגד PCV2, לוח זמנים הכולל שני חיסונים מומלץ: חיסון ראשון (2 מ"ל) ניתן מגיל 3-5 ימים, וחיסון שני ניתן (2 מ"ל) 2-3 שבועות לאחר הזריקה הראשונה.

רמות גבוהות של MDA צפויים כאשר חזירות (sow/gilts) מחוסנות כנגד נגיף PCV2 או כאשר חזירות (sow/gilts) נחשפו לרמות גבוהות של נגיף PCV2. במקרים אלו מומלץ לבצע בדיקה סרולוגית עבור PCV2, על ידי שימוש בדיאגנוסטיקה מתאימה, בכדי לבחור את לוח הזמנים המתאים לחיסון. במקרה של ספק, חסן לפי לוח הזמנים של שני החיסונים.

#### המלצות למתן נכון:

- לפני שימוש בתרכיב אפשר לו להגיע לטמפרטורת חדר ( $15-25^{\circ}\text{C}$ ) ונער היטב לפני השימוש.
- המנע מדקירה מרובה של הבקבוקון.
- השתמש במזרקים ומחטים מחוטאים.
- המנע מהכנסת גורם מזהם.
- המנע משימוש בצידוד חיסון עם חלקים מגומי.

זמן המתנה: אפס (0) ימים.

#### הוראות אחסון:

**יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.**

יש לשמור בקירור ( $2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ ).

אסור להקפיא. יש להגן מפני אור.

חיי מדף לאחר פתיחה ראשונית של הבקבוקון: 8 שעות.

אין להשתמש במוצר ווטרינרי זה לאחר תאריך תפוגה (EXP) אשר רשום על גבי אריזת הקרטון והבקבוקון.

#### אזהרות מיוחדות לשימוש בחיות:

יש לחסן חיות בריאות בלבד.

#### שימוש במהלך הריון והנקה:

אסור לשימוש בזמן הריון והנקה.

#### תגובות בין-תרופתיות וצורות שונות של תגובות:

אין מידע זמין על הבטיחות והיעילות של תרכיב זה בשימוש עם כל מוצר ווטרינרי רפואי אחר. החלטה באם להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי מוצר ווטרינרי אחר צריך להיקבע על בסיס כל מקרה לגופו.

#### מינון יתר (סימפטומים, מקרי חירום, תרופות נגד):

לאחר הזרקה של מינון כפול של התרכיב לא נצפו תופעות לוואי למעט אלו שתוארו תחת "תופעות לוואי".

#### אזהרות פרמצבטיות:

אין לערבב עם כל מוצר ווטרינרי רפואי אחר.

#### אזהרות מיוחדות לאדם:

1. לשימוש וטרינרי בלבד.
2. הרחק מהישג ידם של ילדים.
3. המנע מהזרקה עצמית. מוצר ווטרינרי רפואי זה מכיל שמן מינרלי. הזרקה/הזרקה עצמית מקרית עלולה לגרום לכאב רב ונפיחות, במיוחד אם הזרקת למפרק או אצבע, ובמקרים נדירים עלולה לגרום לאיבוד של האצבע אם טיפול רפואי דחוף לא ניתן. אם הזרקת עם מוצר זה, פנה לטיפול רפואי דחוף גם אם כמות

קטנה הוזרקה וקח את עלון המוצר אתך. אם הכאב ממשיך יותר מ-12 שעות לאחר בדיקה רפואית, פנה לטיפול רפואי בשנית.

**הוראות לזריקת מוצר לא משומש או חומרי פסולת:**

שאל את הווטרינר המטפל איך להפטר מתרופה שאין בה יותר צורך. פעולות אלו אמורות צריכות לעזור להגן על הסביבה.

**תאריך אישור עלון מוצר:**

**מידע נוסף:**

קופסת קרטון המכילה 1 או 10 בקבוקונים של 20, 50, 100, 200 או 500 מ"ל (10, 25, 50, 100 או 250 מנות). לא כל גדלי האריזות משווקים.

**יצרן:** אינטרווט אינטרנשיונל בי.וי., וים דה קורברסטראט 35, 5831 אי אן בוקסמיר הולנד.

**יבואן ומשווק:** ווטמרקט שיווק בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם ישראל, 6085001.  
טל': 03-9393000