

לשימוש חיצוני בלבד!
לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

סקאליבור קולר - SCALIBOR PROTECTOR BAND

קולר להדברת קרציות, זבובי חול

לשימוש חיצוני בלבד
استعمال خارجي فقط
For external use only
Исключительно для
наружного применения



לכלבים קטנים ובינוניים:
משקל: 19 גרם.
תכולה: קולר אחד 48 ס"מ.
לכלבים גדולים:
משקל: 25 גרם
תכולה: קולר אחד 65 ס"מ

קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר.
התכשיר אסור לשימוש בחתולים.
לא לשימוש בחיה שאינה כלב.
לא לשימוש בכלבים מתחת לגיל 7 שבועות.

הרכב: דלתאמטרין 4% W/W Deltamethrin

התוויות:

דוחה קרציות, יעיל למשך 5-6 חודשים.
דוחה עקיצות זבוב החול, יעיל למשך 5-6 חודשים (זבוב חול המעביר לישמניאזיס).

ברישיון השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות. מס' רישום 1251.

התוויות נגד:

התכשיר אסור לשימוש בחתולים. אין להשתמש בכלבים הרגישים לפירתרואידים. אין להשתמש בכלבים הסובלים מלקויות עור. אין להשתמש בגורים מתחת לגיל 7 שבועות.

אזהרות לאדם:

- התכשיר מזיק בבליעה או במגע עם העור.
- התכשיר עלול לגרום לגירוי קל בעיניים.
- יש להימנע ממגע התכשיר עם העור, העיניים והבגדים.
- התכשיר מכיל דלתאמטרין. התכשיר אסור לשימוש על ידי אנשים עם רגישות ידועה לחומר זה.
- מנע מגע של ילדים עם הקולר, בפרט ילדים מתחת לגיל שנתיים. אין לאפשר לילדים לענוד או לגעת בקולר ואין לאפשר לילדים לישון עם כלב העונד קולר.

אמצעי בטיחות ומיגון:

- יש לשטוף ידיים בסבון ומים קרים לאחר ענידת הקולר.
- אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן ענידת הקולר.

סיכונים לסביבה:

- התכשיר רעיל לדגים וליצורים אחרים במים.
- אין להשליך התכשיר למאגרי מים ודרכי ניקוז.
- אין להשליך את הקולר או חלקיו בסביבה.

אזהרות ותופעות לוואי בבע"ח:

- במקרים נדירים נצפו תגובות עוריות מקומיות (גרד, אדמומיות או אובדן שיער) באיזור הצוואר או באופן כללי בעור, אשר עשויות להצביע על רגישות יתר מקומית או כללית.
- במקרים נדירים מאוד דווח על שינויים התנהגותיים (ישנוניות או פעילות יתר) אשר לוו בדרך כלל בגירוי עורי.
- במקרים נדירים מאוד נצפו תופעות של הקיבה והמעי (למשל, הקאות, שלשולים וריור).
- במקרים נדירים מאוד נצפו הפרעות עצב-שריר, למשל בעיות בשיווי משקל/חוסר קואורדינציה (Ataxia) ורעד שרירים. כ- 48 שעות מרגע הסרת הקולר הסימנים בדרך כלל מתחילים להראות רגיעה.
- אם אחת מהתופעות מתרחשת, יש להסיר את הקולר ולהיוועץ ברופא וטרינר. הטיפול הוא בסימנים בלבד, מכיוון שאין חומר נוגד (אנטידוט) ידוע.


- הרעלה במינון יתר: במקרה של בליעת הקולר ע"י הכלב עלולים להתפתח סימני הרעלה, כגון: הפרעות קואורדינציה, רעד, ריוור, הקאות ונוקשות של הרגליים האחוריות. 48 שעות מרגע הסרת הקולר הסימנים בדרך כלל מתחילים להראות רגיעה. במקרים אלה יש לפנות במיידית לרופא וטרינר. טיפול סימפטומטי עשוי לכלול דיאזפם (Diazepam) במידת הצורך.
- במקרים נדירים קרציות עשויות להיצמד בזמן ענידת הקולר, לכן לא ניתן לשלול לחלוטין העברת מחלות מדבקות באמצעות קרציות או זבובי חול.
- בכל מקרה בו מובחנת תופעת לוואי, יש להיוועץ עם הווטרינר המטפל.
- אין להשתמש במקביל בתכשירי הדברה נוספים המכילים חומרים אורגנופוספטים.

שימוש במהלך הריון או הנקה:

- התכשיר מותר לשימוש בכלבות בהריון ובכלבות מניקות.

הוראות שימוש:

- יש לענוד קולר אחד לכלב.
- שים את הקולר סביב הצוואר מבלי להדקו (יש להשאיר מרווח המספיק להעברת שתי אצבעות).
- השאר עודף באורך 5 ס"מ וגזור את החלק הנותר.
- יש לענוד לכלב את הקולר כשבוע לפני חשיפתו לסביבה הנועה. אפקט הגנה מקסימלי מושג שבוע לאחר ענידת הקולר.
- מגע במים אינו פוגע ביעילותו של הקולר. עם זאת, יש להסיר את הקולר לפני רחיצה או הרטבת הכלב בשל סיכונים לסביבה (ראה פרק סיכונים לסביבה).
- יש למנוע את הרטבת הכלב במשך 5 הימים הראשונים לאחר ענידת הקולר.
- במקרה של הופעת נגעים בעור יש להסיר את הקולר עד שהסימנים חולפים.



צעדים מיוחדים לטיפול באריזות לא משומשות של תכשיר וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש בתכשיר וטרינרי:

תכשיר וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או אריזות ריקות של תכשיר וטרינרי יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות המקומיות.

איחסון:

יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית בטמפ' מתחת 25°C, במקום מוצל ונעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים.

הרחק מכל מזון ושתייה של אדם או בע"ח.

הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

עזרה ראשונה ומידע לרופא:

בחדש להרעלה פנה מיד לרופא בצירוף התכשיר והתווית.

למידע נוסף: המרכז הארצי למידע רפואי בהרעלות, בית החולים רמב"ם, חיפה.

טל': 04-8541900.

עזרה ראשונה	
במקרה של מגע בעיניים	<ul style="list-style-type: none"> • הסר בעדינות שאריות חומר מהעיניים. • במידה ומתרחש גירוי בעיניים שטוף במים זורמים כ-5 דקות עד הסרת כל החומר. • אם הנך מרכיב עדשות מגע, הסר אותן רק לאחר שטיפה ראשונית והמשך לשטוף את העיניים במשך 5 דקות לפחות. • במידה והגירוי מכאיב או נמשך יותר ממספר דקות, פנה לקבלת טיפול רפואי.
במקרה של מגע בעור	<ul style="list-style-type: none"> • הסר בעדינות את החומר מהעור, שטוף היטב במים זורמים כ-5 דקות עד הסרת החומר הכימי. • במידת הצורך פנה לקבלת טיפול רפואי.
במקרה של שאיפה	<ul style="list-style-type: none"> • אין צורך בהגשת עזרה ראשונה, פנה לרופא למידע נוסף.
במקרה של בליעה	<ul style="list-style-type: none"> • אין להשקות נפגע חסר הכרה, אין לגרום להקאה, שטוף את הפה במים ושתה כוס מים. במידה ומופיעים סימנים כלשהם או חשד לסימנים, פנה לקבלת טיפול רפואי.

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על-פי הוראות התווית, עלול לפגוע
במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק.