

**לשימוש וטרינרי בלבד**  
ליישום על חתולים בלבד

**ACTIVYL SPOT ON SOLUTION**

**אקטיוויל תמיסת ספוט און**



**לחתולים קטנים ממשקל 0.6 ק"ג ועד 4 ק"ג**

נפח: 0.51 מ"ל

גודל: 100 מ"ג

ליישום על חתולים.

לא ליישום על חתולים מתחת לגיל 8 שבועות.

לא ליישום על חתולים מתחת למשקל 0.6 ק"ג.

**לחתולים גדולים ממשקל 4 ק"ג**

נפח: 1.03 מ"ל

גודל: 200 מ"ג

ליישום על חתולים.

לא ליישום על חתולים מתחת לגיל 8 שבועות.

לא ליישום על חתולים מתחת למשקל 4 ק"ג.

**קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר**

**הרכב:**

כל 1 מ"ל מכיל חומר פעיל: Indoxacarb 19.5%.

**התוויות:**

לטיפול וטיפול מניע כנגד פרעושים (*Ctenocephalides felis*).  
כמו כן התכשיר משמש כחלק מאסטרטגיה טיפולית כנגד דלקת עור אלרגית הנגרמת מרגישות לפרעושים.  
התכשיר משמיד פרעושים בשלבי התפתחות שונים הבאים במגע עם בע"ח מטופלים אקטיוויל.

ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס' 1316

**אזהרות לאדם:**

- התכשיר מכיל Indoxacarb. התכשיר אסור לשימוש אם ידועה רגישות לחומר הפעיל או לכל אחד ממרכיבי התכשיר.
- עלול להזיק במגע עם העור.
- אדי התכשיר עלולים לגרום למשתמש לסחרחורת ולנמנום.
- גורם לגירוי חמור בעיניים.
- אדי התכשיר עלולים לגרום לגירוי במערכת הנשימה.
- חשיפה ממושכת עלולה לגרום להשפעות בריאותיות חמורות.
- התכשיר עלול לגרום לנזק חמור בבליעה.
- התכשיר דליק.



**אמצעי בטיחות ומיגון:**

- הרחק מהישג של ילדים.
- לא לשימוש על ידי ילדים.
- יש להשתמש בכפפות PVC (לפי תקן EN-374/3) ולהגן על העיניים עם משקפי מגן (לפי תקן EN-166).
- יש לשטוף ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.
- אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן השימוש בתכשיר.
- יש להימנע ממגע של התכשיר עם העור.
- יש להימנע משאיפת אדי התכשיר.
- יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים.
- יש להימנע ממגע של התכשיר עם הפה.
- יש להרחיק אותו מאש גלויה, חום גבוה, ניצוצות וכל מקור הצתה אחר.

- בתום הטיפול, הסר בגדים מזוהמים וכבס לפני שימוש חוזר.
- הרחק מכל מזון ושתייה של אדם או בע"ח.

### סיכונים לסביבה:

- התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.
- אין לרחוץ את החיה או לתת לה לשחות במשך 48 שעות שלאחר הטיפול.
- אין להשליך התכשיר למאגרי מים ודרכי ניקוז. אין להשליך את התכשיר או חלקיו בסביבה.

### אזהרות לבע"ח:

- אין להשתמש בתכשיר בחתולים לרבייה (זכרים או נקבות), חתולות בהריון או מניקות.
- אין להשתמש בחתולים חלשים/זקנים/חולים.
- ליישום על חתולים בלבד. אסור ליישום על כלבים או חיות אחרות.
- הימנע ממגע של אריזת התכשיר או תכולתו עם העיניים והפה של החיה או כל בע"ח אחר.

### תופעות לוואי בבע"ח:

- ליקוק התכשיר ע"י החתול במקום הטיפול מייד לאחר הטיפול עלול לעיתים לגרום לריוח מוגבר לזמן קצר. אין זה סימן להרעלה ותופעה זו תעלם לאחר מספר דקות מתום הטיפול. שימוש לפי הוראות העלון יפחית את הליקוק של מקום הטיפול.
- גירוד זמני או נשירת שיער במקום הטיפול עלולים להתרחש. תופעה זו לרוב תסתיים ללא צורך בטיפול.
- בנקודת הטיפול באקטיוויל שעל החתול, עלולה להופיע שמנוניות זמנית או הידבקות שיער.
- שארית לבנה יבשה עלולה להופיע על עור החתול. התופעה נורמלית ולרוב נעלמת מספר ימים לאחר הטיפול.
- תופעות אילו אינן משפיעות על בטיחות ויעילות התכשיר.
- במקרים נדירים של ליקוק התכשיר תופעות של הקיבה והמעיים (למשל, הקאות, ירידה בתיאבון) או תופעות הפיכות הקשורות למערכת העצבים, למשל, חוסר קואורדינציה, רעד, בעיות שיווי משקל/חוסר קואורדינציה (Ataxia), התרחבות אישון (Mydriasis), נצפו בחתולים.
- רגישות, למרות שנדירה, עלולה להתרחש בעקבות שימוש בחומרי הדברה. בהופעת סימני רגישות יש לרחוץ את חית המחמד בסבון עדין ולשטוף עם כמויות גדולות של מים. אם הסימנים ממשיכים, יש להיוועץ בוטרינר באופן מיידי.

### הוראות שימוש:

#### מינון:

המינון המומלץ לחתולים הינו 25 mg Indoxacarb/kg שווה ערך ל- 0.128 ml/kg.

יש לפתוח את כיסוי העטיפה ולהוציא את השפופרת.

**שלב 1** - בעזרת יד אחת יש להחזיק את השפופרת שהפתח כלפי מעלה ומוחזקת הרחק מפני המשתמש ככל האפשר. בעזרת היד השנייה יש לשבור את קצה השפופרת על ידי כיפוף וקיפולו חזרה על עצמו.

**שלב 2** - על הבעל חיים להיות במצב עמידה. הזז את פרוות בעל החיים עד לגילוי העור. הנח את קצה השפופרת על העור באזור בסיס הגולגולת של החתול.

**שלב 3** - לחץ על השפופרת בחוזקה למריחת כל תכולת התכשיר ישירות על עור החתול. יש למנוע נזילה של התכשיר מגופו של בעל החיים.


אין להשתמש יותר מפעם בחודש.

אין למרוח עוד תכשיר עד שהאזור יבש.

אין לבוא במגע עם החתול עד להתייבשות האזור המטופל, בעיקר ילדים.

אסור לישון עם החתול לאחר הטיפול, בעיקר לילדים.

יש לשים לב כי החתול לא מלקק את אזור הטיפול. יש לוודא כי חתולים שטופלו לא ילקקו אחד את השני.



שימוש בודד בתכשיר ימנע התפרצות נוספת במשך לפחות 4 שבועות.  
בסיום השימוש יש לקרוא בעיון את ההנחיות עבור אחסון וטיפול באריזות.

#### **אחסון:**

יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום יבש, מוצל ונעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים.  
הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

#### **טיפול באריזות ריקות:**

תכשיר וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או אריזות ריקות של תכשיר וטרינרי יש להשליך לפח עטופים  
בשקית ניילון.

#### **עזרה ראשונה ומידע לרופא:**

בחדש להרעלה פנה מיד לרופא בצירוף התכשיר והתווית.  
למידע נוסף: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בית החולים רמב"ם, חיפה. טל': 04-8541900.

עזרה ראשונה	
מגע עם העיניים	שטוף בהרבה מים זורמים. אם הנך מרכיב עדשות מגע הסר אותן רק לאחר שטיפה ראשונית והמשך לשטוף את העיניים למשך 15 דקות לפחות. פנה לקבלת טיפול רפואי.
מגע עם העור	הסר בגדים מזוהמים כולל נעליים, שטוף במים וסבון ופנה לקבלת טיפול רפואי.
בשאיפה	פנה את הנפגע למקום מאוורר, פנה לקבלת טיפול רפואי.
בבליעה	שטוף את הפה במים ושתה כוס מים. אין לגרום להקאה. אין להשקות נפגע חסר הכרה. פנה לקבלת טיפול רפואי.

**יצרן:** אינטרווט אינטרנשיונל, לואיזיאנה, ארה"ב  
Intervet International, West Dual Street in Baton Rouge, Louisiana 70814.

**יבוא ושיווק:** וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23 פארק תעשיות חמ"ן. ת.ד. 960, שוהם 6085000.  
טלפון: 03-9393000

תאריך תפוגה ומספר אצווה מופיעים על גבי האריזה.

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.  
השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר שלא על-פי הוראות התווית, עלול  
לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!