

לשימוש וטרינרי בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד  
לשימוש בכלבים בלבד  
**NOBIVAC® DHP**

**נוביווק די.איצ'פי**

תרכיב חי מוחלש של נגיפי דיסטמפר (כלבלבת), אדנו-וירוס 2, ופרוו, מיובש בהקפאה, להמסה ולהזרקה תת עורית  
לכלבים

לשימוש וטרינרי בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד  
לשימוש בכלבים בלבד  
**NOBIVAC® DHP**

**נוביווק די.איצ'פי**

תרכיב חי מוחלש של נגיפי דיסטמפר (כלבלבת), אדנו-וירוס 2, ופרוו, מיובש בהקפאה, להמסה ולהזרקה תת עורית  
לכלבים

**תכולה:**

10 או 50 בקבוקונים המכילים מנה אחת

**תיאור:**

**חומר פעיל:** כל מנה של 1 מ"ל תרכיב מהול מכילה:

Canine distemper virus, strain Onderstepoort	לא פחות מ- $10^{4.0}$ TCID <sub>50</sub> *
Canine adenovirus 2, strain Manhattan LPV3	לא פחות מ- $10^{4.0}$ TCID <sub>50</sub> *
Canine parvovirus, strain 154	לא פחות מ- $10^{7.0}$ TCID <sub>50</sub> *

\*Tissue culture infective dose 50 %

Phosphate buffered saline

**ממיס:** 1 מ"ל לבקבוק:

**התוויות:**

השראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים על מנת לייצר נוגדנים ולהפחית סימנים קליניים של מחלה הנגרמת על ידי זיהום בנגיף הכלבלבת, למנוע סימנים קליניים והפרשה נגיפית הנגרמים על ידי נגיף parvo, להפחית סימנים קליניים של דלקת כבד מדבקת והפרשה נגיפית הנגרמת על ידי adenovirus 1 ולצמצם את הסימנים הקליניים של זיהום בדרכי נשימה והפרשה נגיפית הנגרמים על ידי adenovirus 2.  
**רכישת חסינות:** תוך 7 ימים.  
**משך החסינות:** 3 שנים.

**מינון ודרך מתן:**

מנה אחת להזרקה תת עורית לכלבים.  
יש להמיס תכולת בקבוק אחד ב-1 מ"ל של ממיס מייד לפני השימוש.

יש לבצע חיסון באמצעות מחט ומזרק סטריליים. יש למנוע מגע של התרכיב עם חומרי חיטוי כימיים. אין לחטא את העור עם חומרי חיטוי כימיים טרם מתן החיסון.

### מתן חיסון ראשוני:

הזרקת מנה אחת של התרכיב מספקת חיסון פעיל בכלבים בני 10 שבועות ומעלה. כאשר נדרש חיסון מוקדם יותר ניתן לתת חיסון ראשון בגיל 6 שבועות, אך לאור נוכחותם של נוגדנים אימהיים שעלולים להשפיע על רמת החיסון, יש לחזור ולתת מנה נוספת 2-4 שבועות לאחר מכן (בגיל 10 שבועות או יותר).

### תוכנית חיסונים חוזרת:

כל כלב שקיבל חיסון ראשוני בגיל 6 שבועות צריך לקבל מנה נוספת 2-4 שבועות לאחר מתן החיסון הראשוני. יש לתת מנת דחף כל 3 שנים.

### שימוש במהלך הריון, הנקה או ייחום:

ניתן להשתמש בכלבות בהריון אשר חוסנו בעבר ב-CV2 (strain Onderstepoort), CDV (strain Manhattan LPV3) ו-CAV2 או CPV (strain 154) - אנטיגנים הכלולים בתרכיבים מסדרת Nobivac.

### התוויות נגד: אין

### תופעות לוואי:

לאחר חיסון בתרכיב או לאחר מתן חיסון ביחד עם תרכיב לפטוספירוזיס של Nobivac: באתר הזריקה עלולה להתפתח נפיחות בקוטר של עד 5 מ"מ. לעיתים נפיחות זו עלולה להיות נוקשה וכואבת לתקופה של עד 3 ימים ממועד ההזרקה. לאחר חיסון בתרכיב ביחד עם תרכיב נגד מחלת הכלבת של Nobivac: באתר ההזרקה עלולה להתפתח נפיחות בקוטר של 1-4 ס"מ. הנפיחות עלולה להופיע למשך 3 שבועות לאחר החיסון. הנפיחות עלולה לכאוב במשך 3 ימים לאחר מתן החיסון. במקרים נדירים ייתכנו עלייה בטמפרטורת הגוף ותגובת רגישות יתר חריפה (אנפילקסיס) עם סימנים שעשויים לכלול עייפות, בצקת פנים, גרד, קוצר נשימה, הקאות, שלשול או קריסה. תופעות אלה עלולות להתרחש זמן קצר לאחר חיסון.

אם נצפו תופעות לוואי חמורות או אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל.

### תגובות בין תרופתיות:

אין מידע לגבי היעילות והבטיחות של התרכיב בשימוש עם תכשירים וטרינרים אחרים למעט תרכיבים מסדרת Nobivac נגד לפטוספירוזיס (strain 820K, Ca-12-000) ו/או מחלת הכלבת (Pasteur RIV) ו/או ברונכיטיס נגיפית (B.bronchiseptica strain B-C2) ונגיף פרה-אינפלואנזה (strain Cornell). החלטה על מתן תרכיב Nobivac DHP לפני או אחרי מתן תכשירים וטרינרים אחרים תינתן בכל מקרה לגופו. אין לערבב עם כל תכשיר וטרינרי אחר למעט הממיס או תרכיב נוביווק נגד לפטוספירוזיס (strain 820K, Ca-12-000) ו/או מחלת הכלבת (Pasteur RIV).

### מינון יתר:

מינון יתר בשוגג אינו עשוי לגרום תגובות שונות מאלה שמפורטות בסעיף תופעות לוואי.

### אזהרות לבעלי חיים:

1. יש לחסן כלבים בריאים בלבד.
2. יש להימנע מחשיפת כלבים מחוסנים לזיהומים בשבוע הראשון שלאחר מתן החיסון.
3. זן נגיף הפרווירוס (parvovirus) שבתרכיב עלול להיות מופרש ברמה נמוכה ביותר במהלך עד 8 ימים לאחר מתן התרכיב (תופעת Shedding). עם זאת אין עדויות לכך שתופעה זו יכולה לגרום להופעת סימנים קליניים בחיות שטרם חוסנו ונדבקו.

### אזהרות לאדם:

4. לשימוש ווטרינרי בלבד.
5. הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
6. המנע מהזרקה עצמית.
7. במקרה של הזרקה עצמית יש לשטוף את המקום מיד במים. במקרה של התפתחות תופעות לוואי, יש לגשת לטיפול רפואי ולהציג את העלון ו/או התווית.

### הוראות אחסנה:

יש להגן מפני אור ולאחסן בטמפרטורה של 2°C-8°C. אין להקפיא. אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על הבקבוק.

### חיי מדף לאחר המסה:

יש להשתמש בתרכיב תוך 30 דקות לאחר ההמסה.

**האריזה:**

בקבוק זכוכית סוג I חד מנתי סגור עם פקק גומי ואטום באמצעות מכסה אלומיניום.  
מגשית פלסטיק או אריזת קרטון הכוללת 10 או 50 בקבוקים חד מנתיים.  
הממיס יכול להגיע ארוז ביחד עם התרכיב או באריזה נפרדת.

**צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי :**

מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

**יצרן :** אינטרווט אינטרנשיונל בי.וי., וים דה קורברסטרט 35, בוקסמר 5831, הולנד

**יבואן ומשווק:** ווטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם ישראל, 6085001. טל': 03-9393000

*עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים*

*בתאריך : 02.2018*

*מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים*

*היגו : 6-099-07-12*