

לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

נוביווק קיי סי NOBIVAC® KC

תרכיב של נגיף פרה-אינפלואנזה (Parainfluenza) וחיידק בורדטלה ברונכיספטטיקה (*Bordetella bronchiseptica*) מיובשים בהקפאה

תכולה:

5 בקבוקונים של תרכיב ו-5 בקבוקונים של ממס מימי.

הרכב:

כל מנה (0.4 מ"ל) של נוביווק KC מכילה לפחות $10^{8.0}$ CFU של *Bordetella bronchiseptica* חי מזן B-C2 ולפחות $10^{3.0}$ TCID₅₀ של נגיף parainfluenza כלבי חי מזן קורנל (Cornell).

התוויות:

להשראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים נגד חיידק הבורדטלה ברונכיספטטיקה ונגיף פרה-אינפלואנזה כלבי, למניעת שעלת המכלאות.

תוכנית מתן חיסונים:

הכלבים צריכים להיות לפחות בני שבועיים. כלבים אשר לא חוסנו בעבר יש לחסן במנה אחת לפחות 3 שבועות לפני תקופת הסיכון המשוערת, כגון שהייה זמנית במכלאה, על מנת לקבל הגנה כנגד שני מרכיבי התרכיב. על מנת לקבל הגנה עבור *Bordetella bronchiseptica*, יש לחסן כלבים לא מחוסנים במנה אחת של תרכיב, לפחות 72 שעות לפני תקופת הסיכון הצפויה.

חיסון חוזר:

פעם שנה.

מינון ודרך מתן:

אפשר לממס להגיע לטמפרטורת החדר ($15-25^{\circ}\text{C}$). יש להרחיף באופן אספטי את התרכיב המיובש בהקפאה בעזרת הממס (diluent) הסטרילי המצורף. יש לנער היטב את בקבוקון התרכיב לאחר הוספת הממס. יש למלא מזרק חד פעמי של 1 מ"ל עם מנה של התרכיב (0.4 מ"ל), יש להסיר את המחט ולחבר את המוליך לקצה המזרק. יש לקבע את ראש הכלב בתנוחה נורמלית ישרה, מקם את קצה המוליך בקדמת אחד מהנחיריים ובזהירות לטפטף את כל תכולת המזרק לתוך הנחיר. יש להשתמש בתרכיב תוך שעה אחת לאחר ההמסה.

אזהרות לבעלי חיים:

- יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה לפני החיסון.

שימוש במהלך הריון או הנקה :
התרכיב נמצא בטוח לשימוש בכלבות הרות.

התאמה ותגובות בין תרופתיות:
אין לתת את התרכיב יחד עם טיפול תוך נחירי אחר או במקביל לטיפול אנטיביוטי.

תופעות לוואי:
הפרשות קלות מן העיניים והאף עלולים להופיע החל מיום לאחר החיסון, לעיתים בליווי חירחורים, התעטשויות ו/או שיעולים, במיוחד בגורים מאוד צעירים ורגישים. סימנים אלו בדרך כלל חולפים, אך במקרים מסויימים הם יכולים להמשך עד 4 שבועות. בכלבים המבטאים סימנים קליניים חריפים מאלו, יש לשקול טיפול באנטיביוטיקה מתאימה.

מינון יתר:
במיוחד בגורים צעירים מאוד, סימנים של מחלות דרכי הנשימה העליונות עלולים להופיע לאחר מתן יתר, הכוללים הפרשות אף ועיניים, דלקת גרון, עיטושים ושיעולים. הסימנים עלולים להופיע יום לאחר מתן התרכיב ולהימשך עד 4 שבועות.

- אזהרות לאדם:**
- לשימוש וטרינרי בלבד.
 - לא לשימוש באדם. לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
 - הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
 - המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
 - אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
 - יש לרחוץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב.
 - במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

תנאי אחסון :
יש לאחסן את התרכיב והמדלל בקירור ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$).
יש להגן מפני אור.
יש להשתמש בתרכיב המומס בתוך שעה.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.

סוג ותכולת הבקבוקון:
בקבוקון זכוכית מסוג I של 3 מ"ל (עבור מנה אחת) או של 10 מ"ל (עבור 5 או 10 מנות) סגור עם סטופר גומי Halogenobutyl וחתום עם קובעי אלומיניום המלווה בבקבוקון ממס סטרילי ומוליך

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:
יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות במדינה.

יצרן:
אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, בוקסמר, הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

יבואן ומשווק:
וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם, ישראל 6085001.
טלפון: 03-9393000

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים
בתאריך 01.2018
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים
הינו: 6-101-07-12