

לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

נוביווק פאפי די.פי NOBIVAC® PUPPY DP

תרכיב נגיפי כלבלבת (דיסטמפר) ופרוו מיובשים בהקפאה

תכולה:

10 בקבוקונים המכילים מנה אחת.

הרכב:

תרכיב המכיל זנים חיים מוחלשים המיובשים בהקפאה של נגיף הכלבלבת (CDV מזן Onderstepoort) ונגיף פרוו כלבי (CPV מזן 154) אשר גודלו בתרבית תאים. כל בקבוקון מכיל מנה אחת של תרכיב להרחפה בצורת גוש המיובש בהקפאה, ומכיל לא פחות מ- $10^{5.0}$ TCID₅₀ של הנגיף CDV ולפחות $10^{7.0}$ TCID₅₀ של הנגיף CPV. כמו כן התרכיב מכיל מייצב ושאריות אנטיביוטיקה.

התוויות:

להשראת הגנה חיסונית אקטיבית בגורי כלבים נגד נגיף הכלבלבת (CDV) ומחלת נגיף פרוו כלבי (CPV).

תוכנית מתן חיסונים מומלצת:

נוביווק פאפי די.פי מיועד לשימוש בחיות עם רמות גבוהות של נוגדנים אימהיים נגד כלבלבת ו/או נגיף פרוו כלבי. הגיל המוקדם ביותר אשר בו רמות אלו אינן מפריעות לחיסון הינו 6 שבועות ברוב בעלי החיים. מומלץ לחסן שוב עם נוביווק DHPPi כדי להבטיח הגנה לגורים ספציפיים אשר אינם מגיבים בגיל זה בגלל רמות גבוהות מאוד של נוגדנים אימהיים MDA ולספק הגנה נגד זיהומי הפטיטיס (CAV1), CAV2 ופארא אינפלואנזה. ההמלצות הבאות ניתנות בהנחה כי החיסון עם נוביווק פאפי די.פי מהווה חלק מתכנית חיסון רחבה יותר:

גיל 4-6 שבועות – נוביווק פאפי די.פי.

גיל 8-9 שבועות – נוביווק DHPPi עם נוביווק לפטו.

גיל 12 שבועות - נוביווק DHPPi עם נוביווק לפטו

חיסון חוזר:

מומלץ לחסן את הכלבים חיסון חוזר נגד:

1. כלבלבת, הפטיטיס כלבי – כל שנתיים.

2. נגיף פרוו כלבי, זיהום נגיף פארא אינפלואנזה כלבי – כל שנה.

3. כלבת – פעם בשנה לפי תקנות מדינת ישראל (פעם בשלוש שנים לפי המלצת היצרן).

מינון ודרך מתן:

יש להזריק באופן תת עורי את התכולה של בקבוקון אחד המכיל תרכיב מומס.

יש להמיס מנה אחת של התרכיב בבקבוקון מיידי לפני השימוש על ידי הוספת תכולת בקבוקון אחד של ממס נוביווק (1.0 מ"ל). לאחר ההמסה, יש להשתמש בתרכיב תוך 30 דקות.

יש להשתמש בצידוד סטרילי להזרקה, אך יש להימנע מחשיפת התרכיב לשאריות האלכוהול המחטא.

תופעות לוואי:

תגובות רגישות יתר קלה מסוג אנאפילקטי יכולה להופיע לעיתים לאחר החיסון, כפי שאפשרי בתגובה לחלבונים זרים. תגובות אלו, ברוב המקרים, מוגבלות מעצמן.

אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל.

אזהרות לבעלי חיים:

- יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה.
- יש להימנע עד כמה שניתן מחשיפה של הגור למקור הדבקה פוטנציאלי עד 14 ימים לאחר החיסון.

אזהרות לאדם:

- לשימוש וטרינרי בלבד.
- לא לשימוש באדם. לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לרחוץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב.
- במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

תנאי אחסון :

יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים.
יש לאחסן את התרכיב בקירור ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$). יש להגן מפני אור. אין להקפיא.
יש להשתמש בתרכיב המומס בתוך 30 דקות.
יש להיזהר ולמנוע חשיפה ממושכת או חוזרת לסביבת טמפרטורות גבוהות לאחר ההוצאה מהמקרר לפני השימוש; בזמן חשיפה לתנאי הקיץ החמים, יכולה להיות הפחתה משמעותית ביעילות התרכיב תוך מספר שעות.
את בקבוקון הממס ניתן לאחסן בטמפרטורת החדר.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.

הכמות באריזה:

קופסא המכילה 10 בקבוקונים של תרכיב המכילים מנה בודדת ו-10 בקבוקונים של ממס נוביווק, או קופסא המכילה רק 10 בקבוקונים של תרכיב.

מידע נוסף

ידוע מניסיון שרמת הנוגדנים האימהיים של הגורים בשגר משתנה מאוד, לכן אין להסתמך על בדיקות סרולוגיות שנערכו לכלבה בלבד.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה

בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:

יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות במדינה.

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, בוקסמר, הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

יבואן ומשווק:

וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם, ישראל 6085001.
טלפון: 03-9393000

