

לשימוש וטרינרי בלבד

שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים

לשימוש בבעלי חיים בלבד

פורסיליס פורקולי דילובק פורטה

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

תרכיב חיידקי *E. coli* (אי. קולי) מומת, למתן תוך שרירי לחזירות

הרכב:

בכל מנה של 2 מ"ל:

חומרים פעילים :

F4ab (K88ab) fimbrial adhesin $\geq 9.0 \log_2$ Ab titre¹

F4ac (K88ac) fimbrial adhesin $\geq 5.4 \log_2$ Ab titre¹

F5 (K99) fimbrial adhesin $\geq 6.8 \log_2$ Ab titre¹

F6 (987P) fimbrial adhesin $\geq 7.1 \log_2$ Ab titre¹

LT toxoid $\geq 6.8 \log_2$ Ab titre¹

¹ ממוצע טיטר נוגדנים אשר נמדד לאחר מתן התרכיב לעכברים ביחס 1/20 ממנת החזירות

אג'ובנט: dl- α -tocopheryl acetate - 150mg

התוויות :

השראת הגנה חיסונית פסיבית בחזרזירים על ידי התחסנות פעילה של חזירות בוגרות ומבכירות, על מנת להפחית בתמותה ובסימנים קליניים כגון שלשול בשל אנטרוטוקסיקוזיס נאוונטלי (neonatal enterotoxigenesis), במהלך הימים הראשונים לחיים, הנגרם על ידי זני *E. coli* אלו אשר מבטאים את האדהזינים (adhesins): F4ab (K88ab), F4ac(K88ac), F5(K99), F6(987P) ו/או מייצרים טוקסואיד LT.

התוויות נגד: אין

מינון ותוכנית מתן חיסונים מומלצת :

מינון : לחזירות בוגרות ומבכירות (sows and gilts): 2 מ"ל.

הזרקה תוך-שרירית באזור הצוואר, מאחורי האוזן.

חיסון בסיסי: לחזירות אשר טרם חוסנו בתרכיב, יש להזריק מנת תרכיב החל מ-8 ועד 6 שבועות לפני זמן ההמלטה המשוער, ולתת מנת דחף (booster) 4 שבועות לאחר מכן.

חזרתיות: חיסון חוזר יחיד יבוצע במהלך המחצית השנייה של ההריונות הבאים, כאשר ההעדפה היא לתת מנת תרכיב החל מ-4 ועד 2 שבועות לפני תאריך ההמלטה הצפוי.

תופעות לוואי:

עלייה ממוצעת וחולפת של 1°C עד 3°C בטמפ' הגוף עלולה להתרחש ב-24 שעות הראשונות שלאחר מתן התרכיב, הפחתה בצריכת המזון וירידה בפעילות עלולות לקרות בכ-10% מהחיות ביום החיסון, המצב יחזור לנורמלי לאחר 1-3 ימים. ב-5% מהחיות נצפו נפיחות ואודם זמניים במקום ההזרקה, אשר יחלפו תוך 14 יום. במידה והבחנת בתופעות לוואי נוספות, דווח לרופא הווטרינר המטפל.

אזהרות והמלצות לשימוש נכון :

יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.

לפני השימוש יש לאפשר לתמיסה להגיע לטמפ' החדר (15-25°C) ולנער היטב.

יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים.
יש להימנע מזיהום בקבוק התרכיב.

שימוש במהלך הריון והנקה:

ניתן לשימוש במהלך הריון.

מנת יתר: ללא תופעות מיוחדות מלבד אלו שצוינו בסעיף 'תופעות לוואי'.

זמני המתנה: אפס ימים.

אזהרות לאדם:

1. לשימוש וטרינרי בלבד.
2. הרחק מהישג ידם של ילדים.
3. המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
4. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
5. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
6. במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

תגובות בין תרופתיות:

אין מידע לגבי בטיחות ויעילות בזמן שימוש בו-זמני של תרכיב זה עם מוצרים אחרים.
אין לערבב עם מוצרים אחרים.

הוראות אחסנה: יש לאחסן את התרכיב בטמפ' $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$. אין להקפיא.

אריזה:

אריזת קרטון המכילה בקבוק זכוכית (הידרוליטי Type I) בנפח 50ml עם פקק גומי + מכסה אלומיניום.

חיי מדף:

36 חודשים.

לאחר פתיחת הבקבוק, יש להשתמש בתרכיב תוך 3 שעות.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי, או פסולת שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי: מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פסולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

יבואן:

ווטמרקט שיווק בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם ישראל, 6085000. טל': 03-

9393000