

לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בתרנגולות בלבד
קוקסיוואק®-די2
Coccivac®-D2

תרכיב אאוציסטות חיות (oocysts) של קוקסידיה (coccidia).
תרחיף למתן בריסוס או במזון.

הרכב :

רכיבים פעילים	כמות אאוציסטות מינימלית למנה
<i>Eimeria acervulina</i>	600
<i>Eimeria maxima</i>	200
<i>Eimeria necatrix</i>	400
<i>Eimeria brunetti</i>	200
<i>Eimeria mivati</i>	400
<i>Eimeria tenella</i>	200

חומר משמר: PBS עם 185 מיקרוגרם/מ"ל ג'נטמיצין שהוסף עד 0.004 מ"ל ל - 1,000 מנות ועד 0.002 מ"ל ל - 5,000 מנות.

התוויה:

לחיסון תרנגולות בריאות בגיל יום אחד בריסוס או בגיל 4 ימים במזון לסיוע במניעת קוקסידיוזיס.

תופעות לוואי והתווית נגד:

המוצר לא מומלץ לשימוש במקביל להזנה במזון המכיל קוקסידיוסטטים.

מין מטרה:

תרנגולות.

מינון אופן ודרך מתן, הוראות הכנה ושימוש נכון בתרכיב:

מתן בתא ריסוס:

יש לערבב את התרכיב עם מים מזוקקים, ביחס של 210 מ"ל של מים מזוקקים לכל 1000 מנות של תרכיב ליצירת תמיסה. כל 100 אפרוחים צריכים לקבל 21 מ"ל של תמיסת התרכיב באמצעות תא ריסוס (ניתן להוסיף צבע בתור סמן).

מתן בריסוס לעיניים:

יש לערבב את התרכיב ביחס של 26 מ"ל מים מזוקקים ל- 1,000 מנות של תרכיב ליצירת תמיסה. יש לתת את תמיסת התרכיב באמצעות ריסוס לעיניים באופן פרטני. כל תרנגולת מקבלת מנה של 0.03 מ"ל.

מתן בריסוס למזון:

יש לערבב את התרכיב ביחס של 400 מ"ל של מים לא מוכלרים ל- 1,000 מנות של תרכיב. יש לרסס את התרכיב המהול על פני השטח של המזון. כל תרנגולת מקבלת מנה של 0.4 מ"ל.

זמן המתנה:

אין לחסן במהלך 21 הימים שלפני השחיטה.

הוראות אחסון:

הרחק מהישג ידם של ילדים.
יש לאחסן את התרכיב בטמפרטורה של 2°C - 8°C . אין להקפיא.
יש להשתמש בכל התכולה של הבקבוקון לאחר הפתיחה.
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה אשר מצוין על האריזה.

אזהרות לבעלי חיים:

יש לחסן עופות בריאים בלבד.
לעופות חייבת להיות גישה ללשלת שלהן מכיוון שהדבקה חוזרת נחוצה כדי לעורר חסינות.
היכולת של תרכיב זה להניב תוצאות משביעות רצון תלויה בגורמים רבים כולל, אך לא רק, תנאי האחסון והטיפול על ידי המשתמש, אופן מתן התרכיב, המצב הבריאותי ומידת התגובה של חיות באופן פרטני ומידת החשיפה בשטח. לכן, יש להקפיד על מילוי הוראות השימוש. יש להתייעץ עם רופא למחלות עופות לגבי המלצות נוספות המבוססות על תנאים באזורך בכל זמן נתון.

אזהרות לאדם:

לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
על המשתמש ללבוש מסכה ומשקפי הגנה כאשר הוא מבצע ריסוס על המזון או במדגרה.
אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
יש לרחוץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב.
במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

שימוש במהלך הטלה:

בטיחות התרכיב במהלך הטלה לא בוססה.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.**אי התאמות ותגובות בין-תרופתיות:**

אין לערבב עם תכשירים אחרים.
המוצר לא מומלץ לשימוש במקביל להזנה במזון המכיל קוקסידיוסטטים.

סוג ותכולת האריזה:

אריזה עם 10 בקבוקוני זכוכית עם פקק גומי, המכילים 1,000 מנות (4 מ"ל) או 5,000 מנות (10 מ"ל).

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה**בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:**

יש להשמיד תכולה שלא נעשה בה שימוש. מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

שם היצרן וכתובתו: אינטרווט בע"מ אומהה, א.נ. אי 68103 ארה"ב.

שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 04.2021

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגו: 1-297-07-15