

**נוביווק® רביס**  
**NOBIVAC® RABIES**  
תרחיף להזרקה

**הרכב:** כל מנה (1 מ"ל) מכילה: Inactivated rabies virus, strain *Pasteur RIV*  $\geq 2$  I.U.

**לקבלת פרטים מלאים, הוראות שימוש מפורטות ואזהרות יש לעיין בעלון המצורף.**

**מינון, דרך מתן ומין המטרה:**

מיועד לכלבים, חתולים, בקר, כבשים, עזים, שועלים, חמוסים וסוסים: מנה אחת 1 מ"ל בהזרקה תת-עורית או תוך שרירית.

**הוראות אחסון:**

יש לאחסן  $2-8^{\circ}\text{C}$ . אין להקפיא.

יש להגן מפני אור.

בקבוקון 10 מנות שנוקב – יש להשתמש בו תוך יום עבודה אחד.

**הרחק מהישג ידם של ילדים.**

**סוג ותכולת אריזה:**

אריזת קרטון עם 10 בקבוקוני זכוכית המכילים 1 או 10 מנות, סגורים עם פקק גומי, אטומים עם מכסה אלומיניום.

**לשימוש בבעלי חיים בלבד.**

**שם היצרן:**

Intervet International B.V.

**שם בעל הרישום:**

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

**מספר רישום:**

9-104-07-12

מס' אצווה ותאריך תפוגה מודפסים על גבי הבקבוק ואריזת הקרטון.

## נוביווק® רביס

### NOBIVAC® RABIES

תרכיב מומת, תרחיף להזרקה

**הרכב:** מנה של 1 מ"ל מכילה: Inactivated rabies virus, strain Pasteur RIV  $\geq 2$  I.U.  
אדג'ובנט: 2% Aluminium phosphate .  
חומר משמר: 0.01% Thiomersal .

#### **התוויה:**

לחיסון פעיל של כלבים, חתולים, בקר, כבשים, עזים, שועלים, חמוסים וסוסים בריאים, ובעקרון כל יונק בריא כנגד כלבת.

#### **תופעות לוואי והתוויות נגד:**

לאחר מתן תת עורי, לעיתים עלול להתפתח גוש בר-מישוש חולף באזור ההזרקה.  
לעיתים עלולות להופיע תגובות כלליות של רגישות יתר לאחר מתן התרכיב.  
אין התוויות נגד.

#### **מין מטרה:**

כלבים, חתולים, בקר, כבשים, עזים, שועלים, חמוסים וסוסים.

#### **מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה:**

1 מ"ל בהזרקה תת-עורית או תוך שרירית.  
יש לאפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדר (15-25°C) לפני שימוש.  
יש להשתמש בצידוד הזרקה מחוטא. יש לנער לפני ובזמן השימוש.

#### **תכנית חיסון מומלצת:**

חמוסים	בקר\סוסים	כלבים\חתולים	
3 חודשים*	6 חודשים*	3 חודשים*	חיסון ראשון מעל גיל:
1 שנים**	2 שנים**	3 שנים**	חיסון חוזר כל:
S.C.	I.M.	I.M. or S.C.	דרך המתן:

\*חיסון ראשון יכול להינתן בגיל צעיר יותר, אך חובה לתת זריקה נוספת בגיל 3 או 6 חודשים, תלוי במין החיה.

\*\*המרווח המומלץ בין החיסונים מבוסס על פי תוצאות ניסויי הדבקה בנגיף ( challenge experiments). גופי רגולציה מקומיים עשויים לדרוש חיסון חוזר מוקדם יותר. תוצאות מחקרים סרולוגיים מצביעים על כך שחיסון **כבשים, עזים ושועלים** מעניק הגנה של שנה אחת לפחות.

בכלבים, שיא כייל הנוגדנים: 3 שבועות לאחר החיסון.

#### **הוראות אחסון:**

יש לאחסן בטמפרטורה 2-8°C.  
יש להגן מפני אור. אין להקפיא. יש להרחיק מהישג ידם וראייתם של ילדים.  
בקבוקון 10 מנות שנוקב – יש להשתמש בו תוך יום עבודה אחד.

**אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיעה על גבי האריזה.**

**אזהרות לבעלי חיים:**  
יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.

**אזהרות לאדם המחסן:**  
במקרה של הזרקה עצמית או חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב יש לפנות לייעוץ רפואי ולהציג את עלון התרכיב.

**לשימוש בבעלי חיים בלבד.**

**שימוש בזמן הריון:**  
ניתן לשימוש בזמן הריון בכלבים.

**אי התאמות ותגובות בין תרופתיות:**  
ניתן להשתמש בנוביווק-רביס להמסת תרכיבי כלבים מיובשים בהקפאה מסדרת Nobivac.  
ניתן לתת את נוביווק-רביס בו-זמנית אך בנקודות מתן שונות ביחד עם תרכיב Nobivac leptospirosis.  
אין לערבב עם תכשיר ווטרינרי רפואי אחר מלבד המוצרים הוטרינריים המצויינים לעיל.  
אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של תרכיב זה בשימוש עם מוצר ווטרינרי רפואי אחר למעט המוצרים המצויינים מעלה. החלטה לגבי שימוש תרכיב זה לפני או אחרי מוצר ווטרינרי רפואי אחר צריכה להיקבע על בסיס כל מקרה לגופו.

**סוג ותכולת האריזה:**  
אריזת קרטון עם 10 בקבוקוני זכוכית המכילים 1 או 10 מנות, סגורים עם פקק גומי, אטומים עם מכסה אלומיניום.

**הנחיות להשמדת פסולת אריזות וחומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:**  
כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

**שם היצרן וכתובתו:**  
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

**שם בעל הרישום וכתובתו:**  
אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

*עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הוטרינריים  
בתאריך : 05.2022  
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הוטרינריים  
הינו: 9-104-07-12*