

לשימוש בכלבים בלבד

## **נוביווק® לפטו4**

### **NOBIVAC® LEPTO4**

תרכיב חיידקי לפטוספירה – בקטריין נוזלי (Bacterin) מומת להזרקה.

הרכב: במנה אחת (1 מ"ל) של תרכיב:

מרכיבים פעילים	כמות למנה
Leptospira canicola (LC), LC-NY strain	≥80 hamster PD 80
Leptospira grippotyphosa (LG)	≥80 hamster PD 80
Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-11403 J strain	≥80 hamster PD 80
Leptospira pomona (LP)	≥80 hamster PD 80

לקבלת פרטים מלאים, הוראות שימוש מפורטות ואזהרות יש לעיין בעלון המצורף.

#### **מינון ודרך מתן:**

יש לאחסן במנה אחת (1 מ"ל) תת עורית בגיל 8 שבועות ומעלה. 2-4 שבועות לאחר מכן יש לתת מנת דחף.

מין מטרה: כלבים.

#### **הוראות אחסון:**

יש לאחסן את התרכיב בקירור (2-7°C). אין להקפיא.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

#### **סוג ותכולת אריזה:**

קופסה עם 25 בקבוקונים. בקבוקון אחד מכיל מנה אחת של התרכיב (1 מ"ל).

לשימוש ווטרינרי בבעלי חיים בלבד.

יצרן: אינטרווט בע"מ, אומהה, א.נ. אי 68103 ארה"ב.

בעל הרישום: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

מספר רישום: 6-288-07-15

אצווה:

ת. תפוגה:

# נוביווק® לפטו4

## NOBIVAC® LEPTO4

תרכיב חיידקי לפטוספירה –בקטרין נוזלי (Bacterin) מומת להזרקה.

הרכב: במנה אחת (1 מ"ל) של תרכיב:

מרכיבים פעילים	כמות למנה
Leptospira canicola (LC), LC-NY strain	≥80 hamster PD 80
Leptospira grippotyphosa (LG)	≥80 hamster PD 80
Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-11403 J strain	≥80 hamster PD 80
Leptospira pomona (LP)	≥80 hamster PD 80

חומר משמר: ג'נטמיצין ואמפותריצין B.

### התוויות:

תרכיב נוביווק לפטו4 הוא תרכיב חיידקים מומת המומלץ לחיסונם של כלבים בריאים לסיוע במניעת מחלה ותמותה הנגרמות על ידי *L. pomona*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola* ו-*L. grippotyphosa*, מניעת הפרשת *Leptospira* בשתן (leptospiuria) הנגרמת על ידי *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, ו-*L. grippotyphosa* וסיוע במניעת הפרשת *Leptospira* בשתן הנגרמת על ידי *L. pomona*.

### תופעות לוואי:

במקרים נדירים עלולה להופיע תגובת רגישות יתר מיידית חריפה (אנפילקסיס), חום, עייפות, בצקת בפנים, הקאות או שלשולים זמן קצר לאחר החיסון. אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל.

### מין מטרה: כלבים.

### מינון ודרך מתן:

יש לחסן במנה אחת (1 מ"ל) תת עורית בגיל 8 שבועות ומעלה. 2-4 שבועות לאחר מכן יש לתת מנת דחף. יש להשתמש במזרק ומחט חדשים וסטריליים, שלא עוקרו בדרך כימית. יש לנער היטב לפני שימוש.

### חיסון חוזר:

מנה אחת מדי שנה.

### הוראות אחסון:

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש לאחסן את התרכיב בקירור (2-7°C). אין להקפיא. אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

### אזהרות לבעלי חיים:

יש לחסן כלבים בריאים ונקיים מטפילים בלבד. יש להשתמש במחטים ומזרקים חדשים, לא מעוקרים כימית. יש לסיים את מלוא התרכיב בפתחה ראשונה.

השימוש במוצר ביולוגי עשוי לייצר אנפילקסיס ו/או תגובות דלקתיות אחרות שנובעות מרגישות-יתר. אנטידוט: ניתן לתת אפינפרין, קורטיקוסטרואידים ואנטי-היסטמינים בהתאם לאופי ולחומרת התגובה.

#### **אזהרות לאדם המחסן:**

המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב. במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

#### **לשימוש ווטרינרי בבעלי חיים בלבד.**

#### **שימוש במהלך הריון:**

אסור לשימוש בכלבות הרות.

#### **תגובות בין תרופתיות:**

אין לערבב את התרכיב עם תרכיבים אחרים.

#### **סוג ותכולת אריזה:**

קופסה עם 25 בקבוקונים. בקבוקון אחד מכיל מנה אחת של התרכיב (1 מ"ל), סגור עם פקק גומי, וחתום במכסה אלומיניום.

#### **הנחיות להשמדת פסולת, אריזות וחומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:**

מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשמיד בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

**יצרן:** אינטרווט בע"מ, אומהה, אג. אי 68103 ארה"ב.

**בעל הרישום:** אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

**עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים**

**בתאריך: 08.2020**

**מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים**

**הינו: 6-288-07-15**