



תרכיב מומת כנגד סלמונלה.
 תרחיף להזרקה עבור תרנגולות.



הרכב: כל מנה בנפח 0.5 מייל מכילה:
חומרים פעילים:

Inactivated *Salmonella Enteritidis*, strain PT4: 1 – 6.6 RP*

Inactivated *Salmonella Typhimurium*, strain DT104: 1 – 16.1 RP

Inactivated *Salmonella Infantis*, strain A, SO3499-06: 1 – 26.6 RP

*RP (relative potency): Ratio of antigenic mass (in Units) as compared to the antigenic mass (in Units) of a reference batch, which was shown to be efficacious in chickens

אדגיוונט:

אלומיניום הידרוקסיד 125 מייג.

חומר משמר:

תיומרסל 0.065 מייג.

התוויות:

לחיסון פעיל של תרנגולות מגיל 6 שבועות להפחתת קולוניזציה והפרשה צואתית של *S. Enteritidis* (קבוצה סרולוגית D), *S. Typhimurium* - *S. Heidelberg* (קבוצה סרולוגית B), *S. Infantis*, *S. Hadar* - *S. Virchow* (קבוצה סרולוגית C).

התחלת חסינות לאחר החיסון השני

S. Enteritidis, *S. Typhimurium*, *S. Heidelberg*, *S. Infantis*, *S. Hadar* - *S. Virchow*: 4 שבועות.
S. Heidelberg: 9 שבועות*.
 *נקודת הזמן המוקדמת ביותר שנחקרה.

משך החסינות לאחר החיסון השני

S. Enteritidis: 48 שבועות (הוכח בהוקעה) ו- 90 שבועות (הוכח סרולוגית).
S. Typhimurium: 57 שבועות (הוכח בהוקעה) ו- 90 שבועות (הוכח סרולוגית).
S. Infantis: 51 שבועות (הוכח בהוקעה).
S. Hadar: 51 שבועות (הוכח בהוקעה).
S. Virchow: 51 שבועות (הסקה מדעית).
S. Heidelberg: 57 שבועות (הסקה מדעית).

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי:

לאחר החיסון עלולות להופיע, בשכיחות גבוהה, קשריות קטנות (בגודל עד 8 מיימ) וחולפות באתר ההזרקה. קשריות אלה נעלמות לחלוטין בתוך שבועיים לאחר החיסון השני. חיסון עלול להיות קשור, בשכיחות גבוהה, לתופעות סיסטמיות חולפות וקלות כגון ירידה בפעילות ובצריכת מזון הנמשכת עד יומיים לאחר החיסון הראשון.

תדירות תופעות הלוואי מוגדרת על פי המוסכמות הבאות:

מאוד שכיח (יותר מאחד מתוך עשרה בעלי חיים מטופלים מפגין תופעות לוואי).

שכיח (יותר מאחד פחות מעשרה בעלי חיים בכל 100 בעלי חיים מטופלים).

לא שכיח (יותר מאחד פחות מעשרה בעלי חיים בכל 1,000 בעלי חיים מטופלים).

נדיר (יותר מאחד פחות מעשרה בעלי חיים בכל 10,000 בעלי חיים מטופלים).

מאוד נדיר (פחות מבעל חיים אחד מתוך 10,000 בעלי חיים מטופלים, לרבות דיווחים מבודדים).

אם נצפו תופעות לוואי אחרות או חמורות מאלו שצוינו על גבי העלון, יש ליידע את הווטרנר המטפל.

מין מטרה:

תרנגולות (שלוחות רביה והטלה).

מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה/שימוש נכון בתרכיב:

להזרקה תוך-שרירית. יש לנער היטב לפני השימוש. יש להשתמש במזרקים ומחסים סטריליים. יש לפעול בהתאם לנהלים אספטיים סטנדרטיים.

יש לתת מנה אחת בנפח 0.5 מייל החל מגיל 6 שבועות ומנה שניה בנפח 0.5 מייל לפחות.

4 שבועות לאחר מכן. יש לתת את המנה השניה לא יאחר מ- 3 שבועות לפני תחילת ההטלה.

זמן המתנה:

0 ימים.

הוראות אחסון:

יש לאחסן במקרר (2°C-8°C).

אין להקפיא.

יש להגן מפני אור.

הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

לאחר הניקוב יש להשתמש תוך 10 שעות.

אזהרות לבעלי חיים:

יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.

אמצעים היגייניים ותנאי גידול נאותים צריכים גם הם להיות חלק חשוב מתכנית בקרה להפחתת היארעות של זיהום בסלמונלה (*Salmonella*).

אזהרות לאדם המחסן:

במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, יש לפנות מיד לקבלת ייעוץ רפואי, ולהציג את העלון או את תווית התרכיב לרופא.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

שימוש במהלך ההטלה:

אין להשתמש בעופות בזמן הטלה ובמהלך 3 שבועות לפני תחילת תקופת ההטלה.

אי התאמות ותגובות בין-תרופתיות:

לא קיים מידע זמין בנוגע לבטיחות ויעילות תרכיב זה כאשר נעשה בו שימוש עם כל תכשיר

רפואי וטרינרי אחר. לכן, החלטה להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי תכשירים וטרינריים

רפואיים אחרים צריכה להתקבל על בסיס כל מקרה לגופו. אין לערבב את התרכיב עם תכשיר ווטרינרי אחר.

סוג ותכולת אריזה:

אריזת קרטון המכילה בקבוק 500 מייל מפוליאיתילן עם 1000 מנות תרכיב. הבקבוק סגור עם פקק הלוגינובובטיל ואטום באמצעות מכסה אלומיניום.

הנחיות להשמדת פסולת אריזות וחומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:

כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

שם היצרן וכתובתו:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

שם בעל הרישום וכתובתו:

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 12.2021

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

הינן: 1-303-07-15

