

רעל

לשימוש וטרינרי בלבד

יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים

קרא את הוראות הבטיחות לפני פתיחה או שימוש

לשימוש חיצוני בבעלי חיים בלבד

Amitik® EC

אמיטיק אי סי

הרכב: חומר פעיל: אמיטראז 125 גרם/ליטר (12.5% אמיטראז).

נפח: 2 ליטר

קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש בתכשיר.

לא לשימוש ביתי.

ברישיון השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות. מס' רישום 1734.



התוויות:

להדברה של:

- קרצית בקר עמידה לאורגנו-פוספטים ופירטרואידיים סינתטיים.
- קרציות הגורמות לשיתוק קרצייתי (Paralysis tick) וקרציות האורבות על שיחים על בקר ובקר לחלב.
- קרציות בקר על כבשים, עיזים, צבאים.
- גרב (Mange) בחזירים.

אזהרות לאדם:

- מזיק בבליעה.
- עלול להיות קטלני במקרה של בליעה וכניסה לדרכי הנשימה.
- עלול לגרום לנזק חמור לעיניים.
- עלול לגרום לסחרחורת או נמנום.
- חשוד כגורם לפגמים גנטיים.
- בחשיפה ממושכת או חוזרת עלול לגרום לפגיעה באיברים (כבד, מערכת עצבים מרכזית).
- עלול לגרום לתגובת רגישות יתר (אלרגיה) עורית.
- חשיפה חוזרת עלולה לגרום ליובש או סדקים בעור.

אמצעי בטיחות ומיגון:

- יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים. אסור ליישום בידי ילדים.
- אין להשתמש עד לקריאה והבנה של כל אמצעי הבטיחות.
- קיים סיכון קטן לפיצוץ מהתכשיר אם כמויות מסחריות מעורבות בדליקה. היווצרות קיטור אלים או התפרצות עלולים להתרחש לאחר יישום של זרם מים ישיר על נוזלים חמים. תוצרי פירוק של התכשיר בחשיפה לאש צפויים להיות רעילים בשאיפה. יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים.
- במקרה של שריפה, השתמש בפחמן דו חמצני, חומר יבש, קצף, ערפל מים.
- אם כמות משמעותית של התכשיר מעורבת בשריפה, קרא למכבי אש.
- אין לשאוף את אדי, נתזי, רסיסי התכשיר.
- עלול לגרות את העור והעיניים. יש להימנע ממגע עם העיניים, העור או הביגוד.
- אין לשתות, לאכול או לעשן בכל מגע עם התכשיר.
- לאחר השימוש וכן לפני אכילה, שתיה או עישון, יש לרחוץ את הידיים, הזרועות והפנים ביסודיות עם מים וסבון.
- אין להוציא בגדי עבודה מזהמים מחוץ לאזור העבודה.
- בכל שלבי העבודה עם התכשיר (הכנת התכשיר, ריסוס של בע"ח, ניקוי מיכלים ריקים) יש ללבוש כפפות, ביגוד מגן והגנה לעיניים ולפנים. יש ללבוש אוברול כותנה סגור מהצוואר ועד פרקי כף היד, כובע רחיץ, כפפות PVC בגובה המרפק ומגן פנים. יש להצטייד בביגוד מגן (לפי תקן AS/NZS 4501 SET 2008), ציוד הנעלה מגן (לפי תקן AS/NZS 2210), כפפות מגן (לפי תקן AS 2161), ציוד נשימתי מגן (לפי תקן AS/NZS 1715) וציוד מגן תעשייתי לעיניים (לפי תקן AS 1336 ו- AS/NZS 1337). מומלץ שהביגוד המגן יהיה עשוי מגומי, PVC.
- לאחר כל יום של שימוש: יש לרחוץ את הציוד המגן לפני שימוש חוזר.
- יש להשתמש בתכשיר באוויר הפתוח או באזור מאוורר היטב. במידה והאוויר הטבעי אינו מספק, מומלץ להשתמש במאוורר.
- במידה וישם, מומלץ שיהיו מקלחות בטיחות קרוב למקום בו נעשה שימוש בתכשיר.
- יש למנוע הפצה לסביבה.
- אם אינך חש בטוב לאחר השימוש בתכשיר: פנה לקבלת עצה או עזרה רפואית.
- למידע נוסף ראה גיליון הבטיחות של התכשיר.

סיכונים לסביבה:



- התכשיר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים ובעל השפעות שליליות ארוכות טווח על הסביבה המימית.
- יש למנוע הגעת התכשיר, שאריותיו, תשטיפיו ואריזתו למקורות מים ומערכות ניקוז. אין להשתמש במכלים הריקים לכל מטרה אחרת.
- בשימוש ע"פ ההוראות וההמלצות, אמיטיק אי סי לא צפוי להעלות את הסכנות למקנה או לחיות בר.

אזהרות לשימוש בבע"ח:

- אין ליישם בכבשים המייצרות חלב לצריכת אדם.
- אסור ליישום על סוסים ועל בע"ח אחרים ממשפחת הסוסיים, חתולים או כלבי צ'אוואווה.
- אין לטפל בחיות במזג אויר חם במיוחד (מעל 40°C) או במקרה של עקת חום. יש לוודא שקיימת הצללה הולמת לפני הטיפול.

הוראות שימוש:

מינונים ודרך המתן:

בע"ח	מזיק	שיעור	הערות קריטיות
בקר	קרצית בקר (Rhipicephalus) [Boophilus] microplus)	400 מ"ל/ 200 ליטר מים	יש לטפל במרווחים של 19-21 ימים. מדביר זנים של קרצית בקר שעמידים לאורגנופוספטים ולפירטרואידים סינתטיים.
	קרצית שיתוק (Ixodes) (holocyclus		יש לטפל במרווחים של 7-10 ימים.
	קרצית שיח (Haemaphysalis) (logicornis		יש לטפל במרווחים של 7-21 ימים. יש לעיין בנוסף בסעיף הוראות כלליות.
כבשים, עזים, צבאים	קרצית בקר (Rhipicephalus) [Boophilus] microplus)	400 מ"ל/ 200 ליטר מים	יש לטפל בחיות המוחזקות בהסגר במרווחים של 14-21 ימים. יש לטפל בחיות שמנוידות מרווחים של 3 עד 7 ימים.
חזירים	גרב (Sarcopets) (scarbiei var. suis	40 מ"ל/ 10 ליטר מים	יש להסיר את המזון והמצעים מהדיר, לכסות קערות שתייה ולנקות את הדיר. יש לרסס את החזירים עם לפחות 2 ליטר שטיפת ספריי, במיוחד בתוך האוזניים והרגליים, מתחת ללסתות ובאזורים המכוסים בגלדים. יש להחליף את המצעים שהוסרו בחומרים נקיים. יש לחזור על הטיפול לאחר 7-10 ימים. יש לעיין בנוסף בסעיף הוראות כלליות.

זמני המתנה:

בשר בקר: 4 ימים.

בשר כבש: 24 ימים.

בשר חזיר: 1 ימים.

חלב בקר: 4 ימים.

חלב כבשים: אין ליישם בכבשים המייצרות חלב לצריכת אדם.

הוראות כלליות:

ריסוס ידני: יש לוודא שכל חלקי החיה רטובים באופן יסודי, בייחוד הבטן, החלק הפנימי של הרגליים והאוזניים (חשוב ביותר עבור חזירים). יש לרסן את בעלי החיים בצפיפות לצורך הריסוס.

יש להשתמש במשאבה המסוגלת להעברת תרסיס גס. מומלץ **לא** להשתמש במרססי תרמיל.

יש להכין שטיפת תרסיס טרייה לכל יום טיפול. יש לנקות את מיכל המרסס בסוף כל יום.

שני טיפולים במרווחים של 7-10 ימים, מומלצים בחזירות מבכירות לפי כניסתן למכלאות הגידול, בחזרזירים בגמילה ובחזירים המובאים לראשונה לדיר. יש לטפל בחזירים בכל 3 חודשים.

מרוצי ריסוס:

פעולה	לא מיוצב	מיוצב
	אין צורך בייצוב כאשר משתמשים בכל שטיפת התרסיס בתוך 24 שעות	יש צורך בייצוב כאשר שטיפת התרסיס נשמרת לשימוש מאוחר יותר.
העמסה ראשונית	400 מ"ל / 200 ליטר מים	400 מ"ל / 200 ליטר מים
ערבוב	יש לשפוך כמות נדרשת של אמיטיק אי סי לתוך דלי עם כ-10 ליטר מים ולערבב ביסודיות. יש לשפוך את תוכן הדלי לתוך מיכל נוזלים או אגן. יש לשטוף את הדלי ולהוסיף את התשטיף. יש למלא את המאגר עם נפח המים הכולל הנדרש.	
בחישה	חובה לבחוש את שטיפת התרסיס שבאגן ביסודיות בתחילת כל סבב ריסוס ויש לערבב שוב במידה ויש הפסקה של יותר מחצי שעה במהלך ריסוס.	
חיזוק	בכל פעם שרמת שטיפת התרסיס באגן יורדת ב- 200 ליטר, יש להוסיף 250 מ"ל אמיטיק אי סי, בלי להוסיף מים, ולהמשיך בריסוס. אם מאפשרים לרמת התמיסה לרדת בלי לחזקה, הריכוז של אמיטיק אי סי יירד והיעילות תופחת. יש לחזור על החיזוק עד שלא ניתן לשאוב יותר תמיסה. אם אתה ממשיך בריסוס, יש להכין עוד תמיסה ע"פ שיעור ההעמסה הראשוני ולהשלים את הריסוס. כאשר השטיפה מזדהמת, יש לנקות את האגן לפני העמסה נוספת.	
ייצוב	חשוב: מאחר והשטיפה אינה מיוצבת, יש להשליך כל שאריות שטיפה ויש להכין אצווה חדשה לסבב הריסוס הבא. לחילופין, ניתן לייצב את התמיסה כנדרש.	אם, לאחר הריסוס, נותרת שטיפה ללא שימוש באגן, יש להוסיף סידן הידרוקסידי (סיד כבוי) [מייצב Amitik]. יש לערבב את הסיד עם מים לכדי משחה חלקה ולהוסיף לתוך השטיפה בשיעור של 2 ק"ג / 200 ליטר של שטיפת תרסיס ולבחוש במרץ. חובה לבצע הוספות של סידן הידרוקסידי בשיעור של 1 ק"ג / 200 ליטר שטיפה במרווחים של 2 חודשים כאשר לא מתבצע ריסוס שגרתי. יש לבחוש או לנער במרווחי זמן קבועים.

טיפול בתכשיר שנשפך:

במקרה של תכשיר שנשפך, יש למנוע מהחומר להיכנס אל דרכי ניקוז או למקורות מים. יש ללבוש לבוש ביגוד מגן מלא בהתאם לפרק אמצעי בטיחות ומיגון כולל מגן עיניים/פנים. כל אזורי העור צריכים להיות מכוסים. במידה ויש סיכוי שיצטברו אדים או נתזים באזור ניקוי השפך, מומלץ להשתמש במנשם.

יש לעצור את הנזילה במידה ובטוח לעשות זאת, לספוג את התכשיר ולאסוף את החומר שנשפך. יש לספוג את התכשיר באמצעות חול, ורמיקוליט או חומר סופג מתאים אחר. במידה והנזילה גדולה מדי או אם חומר סופג אינו זמין, נסה ליצור סוללה שתעצור את החומר מהתפשטות או מלהגיע לניקוז או לנתיבי מים. יש לטאטא ולגרוף או לאסוף את השאריות לתוך מכלים מסומנים ולהשליך מיידית. לאחר נזילה, יש לשטוף את האזור ולהימנע מהגעת התשטיף לניקוז. במידה וכמות משמעותית של חומר נכנסת לניקוז, יש להודיע לשירותי החירום.

טיפול באריזות ריקות בתום היישום:

אין להשתמש במכלים הריקים לכל מטרה אחרת.
את האריזה הריקה יש לשטוף היטב במים, לפחות שלוש פעמים, ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס. נקב את האריזה הריקה או מעך. הכנס את האריזות הריקות לתוך שקית ניילון אטומה והשלך לאשפה.
אין לעשות שימוש חוזר במכלים הריקים.

הוראות אחסנה:

- יש לאחסן בטמ' מתחת ל- 30°C באריזה המקורית כשהיא סגורה, באזור מאוורר היטב ללא אור שמש ישיר.
- יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

חיי מדף: ראה מספר האצווה ותאריך התפוגה מסומנים מטה על גבי האריזה.

אין להשתמש בתכשיר לאתר התאריך האחרון המופיע לשימוש על גבי האריזה.

עזרה ראשונה ומידע לרופא:

עזרה ראשונה	
בשאיפה	במקרה של שאיפה והתפתחות של גירוי יש לפנות את הנפגע לאוויר הפתוח ולהשגיח עד התאוששות. אם הגירוי הופך לכואב או מתמשך יותר מכ- 30 דקות יש לפנות לקבלת עזרה רפואית.
מגע עם העור	יש לרחוץ בעדינות וביסודיות עם מים מיד (במידת הצורך השתמש בסבון שאינו שוחק את העור) למשך 5 דקות או עד להסרת התכשיר. במקרה של גירוי בעור או הופעה של פריחה: פנה לקבלת יעוץ רפואי.
מגע עם העיניים	אם מופיע גירוי, יש לשטוף את העין/עיניים המזוהמות עם מים פושרים, בזרם עדין למשך 5 דקות או עד להסרת החומר. פנה לקבלת עצה רפואית אם מופיע כאב או אם הגירוי מתמשך יותר ממספר דקות. יש צורך בזהירות מיוחדת אם האדם הנחשף מרכיב עדשות מגע.
בבליעה	במקרה של בליעה או כניסה לפה, אין לגרום להקאה. יש לשטוף את הפה עם מים ולתת לשתות קצת מים. במידה ומתפתחים תסמינים, או במקרה של ספק, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי.

המרכז הארצי למידע לייעוץ רפואי בהרעלות בית החולים רמב"ם, חיפה טל: 04-7771900
במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא. מידע נוסף מפורט בגיליון הבטיחות של התכשיר.

היצרן: Autopak-Vetlab Group Pty Ltd, NSW 2760, מיוצר באוסטרליה

ייבוא ושיווק: ווטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם 6085000. טלפון 03-9393000

תאריך עדכון התווית: יולי 2023.

השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על פי הוראות התווית, עלול לפגוע
במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

AMI_2L_LB_07.2023