

בוביליס® ויסטה® 5 L5 SQ

Bovilis® Vista® 5 L5 SQ

תרחיף להזרקה

הרכב:

חומרים פעילים לכל מנה (2 מ"ל):

$IBR \geq 10^{3.6} \text{ TCID}_{50}$, $BVD1 \geq 10^{3.8} \text{ TCID}_{50}^*$, $BVD2 \geq 10^{3.5} \text{ TCID}_{50}^*$, $PI_3 \geq 10^{5.1} \text{ TCID}_{50}^*$,
 $BRSV \geq 10^{3.8} \text{ TCID}_{50}^*$

$L. canicola \geq \text{Operative min. RP value}^\#$, $L. grippotyphosa \geq \text{Operative min. RP value}^\#$, $L. hardjo \geq \text{Operative min. RP value}^\#$, $L. icterohaemorrhagiae \geq \text{Operative min. RP value}^\#$,
 $L. pomona \geq \text{Operative min. RP value}^\#$

TCID_{50} - 50% tissue culture infectious dose.

[#] Displaying at least the operative minimum RP value (Relative Potency (RP) = value of test serial compared to an established reference), using current operative master reference.

חומר משמר: Thimerosal בריכוז סופי של $\geq 1:10,000$.

המוצר עלול להכיל שאריות פניצילין או סטרפטומיצין ממצע גידול תרביות התאים להפקת הנגיף.

אדג'ונט: EMA/DDA (Ethylene Maleic Anhydride/Dimethyldioctadecyl ammonium) בריכוז סופי של 10% (V/V).


מין מטרה: בקר.

מינון, דרך ואופן מתן, הנחיות לשימוש נכון:

אזהרה: מחט ההעברה, הכלולה באריזת הקרטון, היא חדה ועשויה לפצוע אותך או את בעלי החיים אם לא מטופלת בצורה נאותה או מושלכת כראוי.

יש להמיס את בקבוקון התרכיב המיובש (Bovilis) Vista 5 SQ עם בקבוקון המדלל הנלווה באמצעות מחט ההעברה. יש לערבב את בקבוקון התרכיב המומס היטב ולהעבירו אל בקבוקון המדלל באמצעות מחט ההעברה באופן הבא:

1. יש להחדיר במלואה את מחט ההעברה אל תוך בקבוקון התרכיב המיובש בהקפאה לשחרור האקום.
2. יש להפוך את בקבוקון התרכיב המיובש בהקפאה עם הפיה כלפי מטה ולהחדיר את הקצה השני של מחט ההעברה בשלמותה אל תוך בקבוק המדלל הסטרילי. יש להקפיד לנקות את פקק הנשם.
3. יש להפוך את הבקבוקון המחובר לבקבוק המדלל כך שבקבוקון התרכיב המיובש בהקפאה ממוקם מתחת לבקבוק המדלל. יש לסחוט כמות מספקת של מדלל סטרילי אל תוך בקבוקון התרכיב המיובש בהקפאה לקבלת תרכיב מומס. יש לערבב היטב.
4. יש להפוך את הבקבוקים המחוברים כך שבקבוקון התרכיב המומס ממוקם מעל לבקבוק המדלל הסטרילי. יש לסחוט את האוויר אל תוך בקבוקון התרכיב המומס.
5. יש לסחוט ולשחרר את בקבוק המדלל הסטרילי כך שכל התמיסה בבקבוקון התרכיב המומס תתנקז אל בקבוק המדלל הסטרילי.
6. יש להפריד את בקבוקון התרכיב המיובש ואת המחט מבקבוק המדלל הסטרילי. יש להסיר את התוויות האחוריות של בקבוקון התרכיב באמצעות הלשונית. יש למקם את התוויות המופרדת על גבי בקבוק המדלל הסטרילי כדי לזהות במדויק את התמיסה החדשה.



יש להזריק 2.0 מ"ל מהתרכיב המוכן, תת עורית לבקר בריא בן 6 חודשים ומעלה, 60 - 14 ימים לפני הרבעה. מומלץ חיסון חוזר מדי שנה. ניתן לחסן לעיתים תכופות יותר בהתבסס על הערכת הסיכון למחלות של המשק או בכל עת בה קיימים או מדווחים תנאי מגיפה. יש להתייעץ עם הווטרינר המטפל.

התוויה: התרכיב נמצא יעיל לחיסון בקר בריא מגיל 6 חודשים ומעלה כנגד מחלות מערכת הנשימה והפלות הנגרמות על ידי IBR, מחלות דרכי הנשימה וזיהום עוברי כולל הדבקה ממושכת בעגלים הנגרמים על ידי BVD (סוג 1 ו-2) ו-BRSV, PI₃; ומחלת העכברת (*Leptospirosis*) הנגרמת על ידי *L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo*, לרבות *L. borgpetersenii* ו-*L. hardjo bovis*, *L. icterohaemorrhagiae* ו-*L. pomona*.

משך החסינות (DOI) שהודגמה במערכת הרבייה היא לפחות 217 ימים עבור IBR ולפחות 206 ימים עבור BVD (סוג 1 ו-2).
משך החסינות (DOI) שהודגמה במערכת הנשימה היא לפחות 182 ימים עבור IBR ולפחות 206 ימים עבור נגיף BVD מסוג 1 ולפחות 200 ימים עבור נגיף BVD מסוג 2.

יעילות במערכת הרבייה והנשימה ומשך חסינות הודגמו עבור מחלות הנגרמות על ידי BVD סוג 1b. התרכיב נמצא יעיל כנגד הפרשה של *L. hardjo* בשתן.

התרכיב בטוח לשימוש בעגלות ובפרות הרות, או בפרות הרות המניקות עגלים, בתנאי שהפרות והעגלות בעדר חוסנו במהלך 12 החודשים שקדמו להרבעה בתרכיבים המכילים נגיף חי מוחלש מסוג IBR ו-BVD.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי: תגובות ארעיות קלות עלולות להופיע במקום ההזרקה.
אם מופיעה תגובה אלרגית, יש לטפל באפינופריין.
לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים נא ליצור קשר עם חברת אינטרווט ישראל בטלפון: 09-9533375

זמן המתנה: אין לחסן במהלך 21 יום לפני השחיטה.

הוראות אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה 2°C-8°C.
אין להקפיא.

יש להשתמש בתרכיב מיד לאחר הכנתו. אין לשמור תוכן חלקי.
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.

אזהרות מיוחדות לבעלי חיים: יש להשתמש בתכשיר רק בבקר בריא. לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי לגבי האפשרות לסיכונים בריאותיים בעובר, הקשורים בחיסון של בעלי חיים בהריון בתרכיבים חיים על סמך ניסויים קליניים, שבוצעו לצורך רישום. יש לדון עם הוטרינר המטפל באפשרויות לחסן חיות הרות בנגיפים חיים.

אזהרות מיוחדות לאדם המחסן: המנע מהזרקה עצמית. במקרה של הזרקה בשוגג, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית עם אריזת המוצר ולהציג עלון או תווית התרכיב לרופא המטפל.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה: כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

שימוש במהלך הריון והנקה: התרכיב נמצא בטוח לשימוש בעגלות ובפרות בהריון ומניקות בתנאי, שהפרות והעגלות בעדר חוסנו במהלך 12 חודשים לפני ההרבעה, בתרכיבים המכילים נגיפים חיים מוחלשים של IBR ו-BVD.

תגובות בין תרופתיות ואי התאמות: אין מידע זמין לגבי בטיחות ויעילות התרכיב בעת השימוש עם כל מוצר רפואי וטרינרי אחר. אין לערבב תרכיב זה עם מוצרים וטרינריים אחרים.

מתן יתר: התגובות במתן יתר אינן שונות מתגובות במתן מנה אחת.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת אריזה: הרכיב המיובש נמצא בבקבוקוני זכוכית סגורים עם פקקי גומי המכילים 50 מנות. הבקטרין הנוזלי נמצא בבקבוקוני זכוכית או פלסטיק עם פקקי גומי המכילים 100 מ"ל עם 50 מנות. בבקבוקון אחד מכל סוג ארוזים יחד בקופסת קרטון.

שם היצרן וכתובתו: Intervet Inc., 35500 West 91st Street, DeSoto, Kansas USA
שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרווט ישראל בע"מ, א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 09.2025
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: 2-295-07-15