

בוביליס® ויסטה SQ once

Bovilis® Vista once SQ

תרכיב מיובש בהקפאה. יש להמיס את התרכיב עם המדלל הסטרילי הנלווה לקבלת תרחיף להזרקה.

הרכב: מנה אחת (2 מ"ל) מכילה:

נגיפים חיים מוחלשים:

Bovine Rhinotracheitis (IBR) $\geq 10^{3.6}$ TCID₅₀, *Bovine Virus Diarrhoea* (BVD)1 $\geq 10^{3.8}$ TCID₅₀*,
BVD2 $\geq 10^{3.5}$ TCID₅₀*, *Parainfluenza*3(Pi₃) $\geq 10^{5.1}$ TCID₅₀*, *Bovine Respiratory Syncytial Virus*
(BRSV) $\geq 10^{3.8}$ TCID₅₀*.

ותרביות חיידקים מוחלשים:

Mannheimia haemolytica $\geq 1 \times 10^6$ CFU**, *Pasteurella multocida* $\geq 8 \times 10^5$ CFU**

*TCID₅₀- 50% tissue culture infectious dose

**CFU – Colony Forming Units

המוצר עלול להכיל שאריות פניצילין וסטרפטומיצין ששימשו כחומר משמר במצע גידול תרביות התאים להפקת הנגיף.

מין מטרה: בקר.

מינון, דרך ואופן מתן, הנחיות לשימוש נכון:

יש להמיס את התרכיב המיובש בהקפאה עם המדלל הנלווה ולערבב היטב.

יש להזריק 2 מ"ל מהתרכיב המוכן, תת עורית לבקר בריא בן 3 חודשים ומעלה.

מומלץ חיסון חוזר מדי שנה. ניתן לתת חיסון נוסף לעייתים תכופות יותר בהתבסס על הערכת הסיכון למחלות במשק או בכל עת בה קיימים או מדווחים מצבי מגיפה. יש ליידע את הווטרינר המטפל.

התוויות: התרכיב נמצא יעיל לחיסון בקר בריא מגיל 3 חודשים ומעלה כנגד מחלות מערכת הנשימה והפלות

הנגרמות על ידי IBR, מחלות דרכי הנשימה וזיהום עוברי כולל הדבקה ממושכת בעגלים הנגרמים על ידי BVD (סוג 1 ו-2) ו- *Mannheimia haemolytica* ;Pi₃, BRSV ו- *Pasteurella multocida*.

משך החסינות (DOI) שהודגמה במערכת הנשימה היא לפחות שנה עבור IBR ו- BVD (סוג 1 ו-2), ולפחות 16 שבועות עבור *Mannheimia haemolytica* ו- *Pasteurella multocida*.

משך החסינות (DOI) שהודגמה במערכת הרבייה היא לפחות 217 ימים עבור IBR ולפחות 206 ימים עבור BVD (סוג 1 ו-2). משך החסינות (DOI) כנגד BRSV ו- Pi₃ לא נבדקה. משך ההגנה שהוצג הינו כנגד BVD type 1b.

התרכיב בטוח לשימוש בעגלות ובפרות הרות, או בפרות הרות המניקות עגלים, בתנאי שהפרות והעגלות בעדר חוסנו במהלך 12 החודשים שקדמו להרבעה, בתרכיבים המכילים נגיף חי מוחלש מסוג IBR ו-BVD.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי:

תגובות ארעיות קלות עלולות להתרחש במקום ההזרקה.

אם מופיעה תגובה אלרגית, יש לטפל באפינפרין.

לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים נא ליצור קשר עם חברת אינטרווט בטלפון: 09-9533375.

זמן המתנה: אין לחסן במהלך 21 יום לפני שחיטה.

הוראות אחסון:

יש לאחסן בטמפרטורה 2°C-8°C.

אין להקפיא.

הרחק מהישג ידם וראייתם של הילדים.

אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
יש להשתמש בתרכיב מיד לאחר הכנתו. אין לשמור תוכן חלקי.

אזהרות מיוחדות:

- **אזהרות לבעלי חיים:**
יש להשתמש בתכשיר רק בבקר בריא. לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי לגבי האפשרות לסיכונים בריאותיים בעובר, הקשורים בחיסון של בעלי חיים בהריון בתרכיבים חיים על סמך ניסויים קליניים שבוצעו לצורך רישום. יש לדון עם הרופא הווטרינר המטפל באפשרויות חיסון חיות הרות בנגיפים חיים.
- **אזהרות לאדם המחסן:**
המנע מהזרקה עצמית. במקרה של הזרקה בשוגג, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית עם אריזת המוצר ולהציג עלון או תווית התרכיב לרופא המטפל.
- **אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה:** כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוז.
- **שימוש במהלך ההריון:**
התרכיב נמצא בטוח לשימוש בעגלות ובפרות בהריון ומניקות בתנאי, שהפרות והעגלות בעדר חוסנו במהלך 12 חודשים לפני הרבייה, בתרכיבים המכילים נגיפים חיים מוחלשים של IBR ו- BVD.
- **תגובות בין תרופתיות:** אין מידע זמין לגבי בטיחות ויעילות התרכיב בעת השימוש עם כל מוצר רפואי וטרינרי אחר. אין לערבב תרכיב זה עם מוצרים וטרינריים אחרים.
- **מתן מינון יתר:** התגובות במתן מינון יתר אינן שונות מתגובות במתן מנה אחת.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת אריזה: קופסה עם בקבוקון זכוכית המכיל 10 מנות תרכיב מיובש בהקפאה ובקבוקון או שקית מזכוכית או פלסטיק המכילים 20 מ"ל מדלל סטרילי.

שם היצרן וכתובתו: Intervet Inc. 275 South Lake Street, Building 5, Worthington, MN, USA
שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

תווית זו נבדקה ואושרה ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 03.2025
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: 15-07-294-2

Exp.:

Lot: