

נביווק® מתומן DAPPv+L4
Nobivac® Canine DAPPv+L4

25 X 1 מנה

תרכיב המכיל רכיב מיובש בהקפאה שלאחר המסתו עם הבקטרין הנוזלי, מתקבל תרחיף להזרקה.

הרכב: מנה אחת (1 מ"ל) של תרכיב מכילה:

נגיפים חיים מוחלשים (Nobivac® DAPPv):

Canine Distemper Virus (CDV) Distemperoid strain $\geq 10^{3.7}$ TCID₅₀, *Canine Adenovirus*

Type 2 (CAV-2), Ditchfield strain $\geq 10^{4.8}$ FAID₅₀, *Canine Parainfluenza (CPI), CPI-PR*

strain $\geq 10^{4.3}$ FAID₅₀, *Canine Parvovirus (CPV), SAH-CPV-2b strain* $\geq 10^{5.1}$ FAID₅₀,

בקטרין חיידקים מומתים (Nobivac® Lepto4):

Leptospira canicola (LC), LC-NY strain $\geq 8/10$ hamsters survive challenge,

Leptospira grippotyphosa (LG) $\geq 8/10$ hamsters survive challenge,

Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-11403 J strain $\geq 8/10$ hamsters survive challenge,

Leptospira pomona (LP) $\geq 8/10$ hamsters survive challenge.

TCID₅₀: 50% tissue culture infective dose.

FAID₅₀: 50% fluorescent antibody infective dose.

מכיל Gentamicin B-ו Amphotericin כחומרים משמרים.

מין מטרה: כלבים.

מינון, דרך ואופן מתן, הוראות הכנה והנחיות לשימוש נכון: יש להשתמש במזרקים ומחטים חדשים, שלא עברו עיקור כימי.

יש לנער את בקבוקון ה-Nobivac® Lepto4 ולהעביר את תכולתו לבקבוקון Nobivac® DAPPv באופן אספטי. יש לערבב בעדינות עד להמסה.

יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) בהזרקה תת עורית.

ניתן לתת את המנה ההתחלתית בגיל 8 שבועות ומעלה. יש לחזור על החיסון לאחר 2-4 שבועות. דרושות 2 מנות לפחות לצורך השגת חיסוניות ראשונית.

נוכחות נוגדנים אימהיים ידועה כגורם מפריע להתפתחות חיסוניות פעילה בכלבים וברוב בעלי החיים הצעירים יידרשו חיסוני דחף נוספים.

משך החסינות (DOI) לתרכיב לא נבדקה ויש לפעול לפי המלצות היצרן – מומלץ לחזור על החיסון (מנת תרכיב אחת) מדי שנה.

התוויה: התרכיב נמצא כיעיל לחיסון כלבים בריאים בני 8 שבועות ומעלה כנגד נגיפי canine distemper

(כלבלבת), canine adenovirus type 1 (דלקת כבד), canine parainfluenza, canine parvovirus

והחיידקים *Leptospira canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*, ו- *L. grippotyphosa*.

התרכיב גם נמצא כיעיל נגד תמותה ו- leptospirosis (הפרשה של *Leptospira* בשתן) הנגרמים על ידי *L.*

canicola, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*, ו- *L. grippotyphosa*.

תחילת חסינות (OOI): לא נבדק.

משך החסינות (DOI): לא נבדק.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי: במקרים נדירים עלולה להופיע תגובת רגישות יתר (אנפילקסיס) אקוטית וחולפת. מתן אנטידוט: אפינפריין, קורטיקוסטרואידים ואנטיהיסטמינים בהתאם לאופי וחומרת התגובה. חום, עייפות, התנפחות הפנים, הקאות או שלשולים עלולים להופיע זמן קצר לאחר החיסון. מידע המצביע על התפתחות עכירות הקרנית (corneal opacity) אינו קשור לשימוש בתכשיר זה. חשוב לדווח על אירועים חריגים על מנת לאפשר ניטור על בטיחות המוצר. לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים יש לפנות לחברת אינטרווט בטלפון: 09-9533375.

הוראות אחסון: הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים. יש לאחסן את התרכיב בטמ' של 2°C - 8°C . אין להקפיא. יש להשתמש בכל תכולת הבקבוקון מיד לאחר ההמסה. אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אזהרות מיוחדות לשימוש בבעלי חיים: יש לחסן כלבים בריאים בלבד, שאינם נגועים בטפילים. שימוש בתכשיר ביולוגי עשוי לגרום לתגובה אלרגית חריפה (anaphylaxis) ו/או לתגובות רגישות יתר דלקתיות אחרות במעורבות מערכת החיסון. ניתן לטפל ב-Epinephrine, corticosteroids ו-antihistamines, תלוי באופי וחומרת התגובה.

הגיל, בו הנוגדנים האימהיים כנגד canine parvovirus אינם מפריעים יותר להשראת חיסונית פעילה, משתנה בהתאם לרמת הנוגדנים (טייטר) שמצויה בדם האם ובכמות נוגדני הקולוסטרון שהגור ספג. אין לערבב את התרכיב המוכן או את אחד ממרכיביו עם מוצר רפואי אחר. אין לתת את הבקטרין הנוזלי בנפרד.

אזהרות מיוחדות לאדם המחוסן: במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תויות התרכיב.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה – אזהרות ואמצעים להפחתת סיכון סביבתי: כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

שימוש במהלך הריון: אין לחסן כלבות הרות.

אי התאמות עיקריות: אין לערבב את התרכיב המוכן או את אחד ממרכיביו עם מוצר רפואי אחר. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות התרכיב בשימוש במקביל עם תכשירים רפואיים וטרינרים אחרים.

מתן מנת יתר: ללא סימנים מיוחדים.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת האריזה: 25 בקבוקוני זכוכית Nobivac® DAPPv המכילים מנה אחת של רכיב מיובש בהקפאה, ו-25 בקבוקוני זכוכית Nobivac® Lepto4 המכילים מנה אחת (1 מ"ל) של רכיב בקטרין נוזלי, סגורים בפקק גומי ואטומים במכסה אלומיניום.

שם היצרן וכתובתו: Intervet Inc., Omaha, NE, USA
שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.
טל: 09-9533375

תויות זו נבדקה ואושרה ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 11.2025
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: 6-310-07-15

Lot:

Exp.: