

קוואנטום® DA2PPvL
Quantum® Dog DA2PPvL

תרכיב מיובש בהקפאה. לאחר המסתו עם המדלל המצורף מתקבל תרחיף להזרקה.

הרכב: מנה אחת (1 מ"ל) של תרכיב מכילה:

נגיפים חיים:

Canine Distemper Virus (CDV), Distemperoid strain $\geq 10^{3.7}$ TCID₅₀,
Canine Adenovirus Type 2 (CAV-2), Ditchfield strain $\geq 10^{4.8}$ FAID₅₀,
Canine Parainfluenza (CPI), CPI-PR strain $\geq 10^{4.3}$ FAID₅₀,
Canine Parvovirus (CPV), SAH-CPV-2b strain $\geq 10^{5.1}$ FAID₅₀,

חיידקים מומתים:

Leptospira canicola (LC), LC-NY strain $\geq 8/10$ survivors after challenge,
Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-11403 J strain $\geq 8/10$ survivors after challenge.

תכולת אריזה:

האריזה מכילה 25 בקבוקונים של תרכיב מיובש בהקפאה ו-25 בקבוקונים של מדלל.

מין מטרה: כלבים.

דרך מתן: הזרקה תת עורית או תוך שרירית.

הוראות אחסון: יש לאחסן בטמפ' של 2°C-8°C. אין להקפיא.

לפני השימוש יש לעיין בעלון המצורף לאריזה.
לשימוש בבעלי חיים בלבד.
הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.

שם היצרן: Intervet Inc. Elkhorn NE, USA
שם בעל הרישום: אינטרווט ישראל בע"מ.

מספר רישום: 6-125-13-12

Exp.:
Lot:

קוואנטום® DA2PPvL
Quantum® Dog DA2PPvL

תרכיב מיובש בהקפאה. לאחר המסתו עם המדלל המצורף מתקבל תרחיף להזרקה.

הרכב:

מנה אחת (1 מ"ל) של תרכיב מכילה:

נגיפים חיים:

Canine Distemper Virus (CDV), Distemperoid strain $\geq 10^{3.7}$ TCID₅₀¹,
Canine Adenovirus Type 2 (CAV-2), Ditchfield strain $\geq 10^{4.8}$ FAID₅₀²,
Canine Parainfluenza (CPI), CPI-PR strain $\geq 10^{4.3}$ FAID₅₀²,
Canine Parvovirus (CPV), SAH-CPV-2b strain $\geq 10^{5.1}$ FAID₅₀²,

חיידקים מומתים:

Leptospira canicola (LC), LC-NY strain $\geq 8/10$ survivors after challenge,
Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-11403 J strain $\geq 8/10$ survivors after challenge.

¹TCID₅₀: 50% tissue culture infective dose.

²FAID₅₀: 50% fluorescent antibody infective dose.

מכיל thimerosal ו-gentamicin כחומר משמר.

מין מטרה: כלבים.

מינון, דרך ואופן מתן, הנחיות לשימוש נכון:

יש להעביר באופן אספטי את תוכן בקבוקון המדלל הסטרילי (sterile diluent) אל בקבוקון התרכיב קוואנטום DA2PPvL. יש לערבב בעדינות עד להמסה. יש להשתמש בכל התכולה מיד לאחר ההמסה. יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) תת עורית או תוך שרירית. מנה ראשונית של התרכיב יכולה להינתן בגיל 6 שבועות או בגיל מאוחר יותר. יש לתת חיסון חוזר (מנה אחת של תרכיב) לאחר 2-4 שבועות. נדרשות לפחות שתי מנות של התרכיב לשם התחסנות ראשונית. נוכחות נוגדנים אימהיים ידועה כגורם מפריע להתפתחות חיסוניות פעילה בכלבים וברוב בעלי החיים הצעירים יידרשו חיסוני דחף נוספים. משך החסינות (DOI) לתרכיב לא נבדקה ויש לפעול לפי המלצות היצרן - מומלץ לחזור על החיסון (מנת תרכיב אחת) מדי שנה. יש להשתמש במזרק ומחט חדשים וסטריליים, שלא עוקרו בדרך כימית.

התוויה:

התרכיב הוכח כיעיל לחיסון של כלבים בריאים מגיל 6 שבועות ומעלה נגד:

Canine Distemper Virus, Canine Adenovirus type 1 (hepatitis), Canine Adenovirus type 2 (respiratory disease), Canine Parainfluenza Virus, Canine Parvovirus, *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*.

תחילת חסינות: לא נבדק.

משך החסינות: לא נבדק.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי:

בעת ההזרקה עלול להיגרם כאב, אשר אמור לחלוף תוך מספר שניות עד חמש דקות. לאחר החיסון, נפיחות קלה וחולפת (לעיתים כואבת) עלולה להופיע באזור ההזרקה. במקרים נדירים עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר (אנפילקסיס). מתן אנטידוט: אפינפריין, קורטיקוסטרואידים ואנטיהיסטמינים בהתאם לאופי וחומרת התגובה. חום, עייפות, התנפחות הפנים, הקאות או שלשולים עלולים להופיע זמן קצר לאחר החיסון. מידע המצביע על התפתחות עכירות הקרנית (corneal opacity) אינו קשור לשימוש בתכשיר זה. לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים יש לפנות לחברת אינטרווט ישראל בע"מ בטלפון 09-9533375.

הוראות אחסון:

יש לאחסן את התרכיב בטמפ' של $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$. אין להקפיא. הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים. אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. לאחר ההמסה יש להשתמש מיידית.

אזהרות מיוחדות לשימוש בבעלי חיים:

יש לחסן כלבים בריאים בלבד, שאינם נגועים בטפילים. הגיל של גורי הכלבים שבו הנוגדנים האימהיים כנגד Canine Parvovirus אינם מפריעים יותר להשראת חיסונית פעילה, משתנה בהתאם לרמת הנוגדנים (טיטר) שמצויה בדם האם ובכמות נוגדני הקולוסטרם שהגור ספג.

אזהרות מיוחדות לאדם המחסן:

במקרה של חשיפה, יש לפנות לרופא.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה – אזהרות ואמצעים להפחתת סיכון סביבתי:

כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

שימוש במהלך הריון והנקה:

אין לחסן כלבות הרות.

מתן מנת יתר:

ללא סימנים מיוחדים.

אי התאמות עיקריות:

אין לערבב את התרכיב עם תכשירים אחרים, למעט המצוין בעלון זה.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת האריזה:

קופסת פלסטיק המכילה 25 בקבוקוני תרכיב מיובש בהקפאה ו-25 בקבוקוני מדלל. תרכיב מיובש בהקפאה (קוואנטום DA2ppvL): בקבוקון זכוכית המכיל מנה אחת של תרכיב, סגור עם פקק גומי וחתום במכסה אלומיניום. פקק גומי (Sterile diluent): בקבוקון זכוכית או פוליאתילן המכיל 1 מ"ל מים סטריליים, סגור עם פקק גומי וחתום במכסה אלומיניום.

שם היצרן וכתובתו: Intervet Inc. Elkhorn NE, USA
שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרווט ישראל בע"מ, א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.
טל: 09-9533375 .

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: **11.2025**
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: **6-125-13-12**