

בוביליס קריפטיום Bovilis Cryptium

תחליב להזרקה

הרכב במנה של 2 מ"ל תרכיב:
חומר פעיל:

Cryptosporidium parvum Gp40¹: At least 1.0 U²

¹ Gp40: Glycoprotein 40

² ELISA unit as measured in potency test

אדג'ובנט:

Montanide ISA70VG: 1140 - 1260 mg
Aluminium hydroxide: 2.45 - 3.32 mg

חומר משמר:

Thiomersal: 0.032 - 0.069 mg

מין מטרה:
בקר (פרות ועגלות הרות).

מינון, דרך ואופן מתן, הנחיות לשימוש נכון:

מתן תת עורי בצד הצוואר.
יש לאפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש.
יש לנער היטב לפני השימוש, ומדי פעם במהלך השימוש, בכדי להבטיח אחידות התרכיב לפני המתן.
יש לנקוט בהליכים אספטיים המקובלים במהלך החיסון.
יש להשתמש רק במזרקים ומחטים סטריליים.
מומלץ להשתמש במכשיר להזרקת מנות מרובות בעת חיסון של הרבה בעלי חיים.
יש לתת את התרכיב בצד הצוואר.

מנה אחת: 2 מ"ל.

חיסון ראשוני מורכב מ-2 מנות, בהפרש של 4 עד 5 שבועות ביניהן, בשליש השלישי של ההיריון. יש להשלים לפחות 3 שבועות לפני ההמלטה. רצוי לתת מנות עוקבות אלה בצדדים שונים של בעל החיים.
חיסון חוזר מורכב ממנה אחת בשליש השלישי של כל הריון עוקב. יש להשלים את החיסון לפחות 3 שבועות לפני ההמלטה.

התוויות:

חיסון אקטיבי של פרות ועגלות הרות בכדי להעלות את הנוגדנים בקולוסטרם שלהן כנגד Gp40 של *Cryptosporidium parvum*, לשם חיסון פסיבי של עגלים בכדי להפחית סימנים קליניים (כגון שלשול) הנגרמים על ידי *C. parvum*.

עגלים שזה עתה נולדו:
תחילת חסינות: חיסון פסיבי מתחיל מתחילת ההזנה בקולוסטרם.

משך חסינות: בעגלים המקבלים קולוסטרום וחלב מעבר כמצוין ואשר נחשפו בהמלטה, הודגמה חסינות פסיבית עד גיל שבועיים.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי:

בקר (פרות ועגלות הרות):

שכיחות מאוד (יותר מבעל-חיים אחד מתוך 10 בעלי חיים מטופלים)	נפיחות באזור ההזרקה ¹ , כאב באזור ההזרקה, חום באזור ההזרקה, גרנולומה באזור ההזרקה. עליית טמפרטורה ² .
לא שכיחות (1-10 בעלי חיים מתוך 1,000 בעלי חיים מטופלים)	דלקת שרירים ³ מורסה באזור ההזרקה ⁴

¹גודל ממוצע של עד 14 ס"מ, גודל מקסימלי עד 40 ס"מ, גודל הנפיחות יורד עם הזמן, אך עלולה להימשך כדלקת גרנולומטית כרונית מעבר לאזור הזרקה למשך 125 ימים לפחות.

²עלייה ממוצעת עד 1°C עם מקסימום של 1.8°C, חזרה לטווח הרגיל ביום ה-2 לאחר החיסון.

³תגובה דלקתית דימומית גרנולומטית ברקמות עוריות ותת-עוריות עם דלקת המתפשטת לתוך רקמת השריר הבסיסית.

⁴מורסה בקוטר של עד 1 ס"מ זוהתה בצוואר לאחר החיסון השלישי.

לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים נא ליצור קשר עם חברת אינטרווט ישראל בע"מ בטלפון: 09-9533375.

זמן המתנה:

אפס ימים.

הוראות אחסון:

הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.

יש לאחסן במקרר (2°C – 8°C). אין להקפיא. יש להגן מפני אור.

לאחר הניקוב והשימוש הראשון, יש לאחסן את התרכיב זקוף ובקירור (2°C – 8°C) עד לשימוש הבא.

אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

חיי מדף לאחר פתיחת האריזה הראשונה: 28 ימים.

אזהרות מיוחדות:

אזהרות מיוחדות לכל מין המטרה:

יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.

הזנת עגלים

הגנת העגלים תלויה בגמיעה מספקת של קולוסטרום וחלב מעבר מפרות מחוסנות. מומלץ להגמיע את כל העגלים בקולוסטרום ולאחר מכן בחלב מעבר במהלך 5 הימים הראשונים לחייהם. יש להגמיע ב-3 ליטר קולוסטרום לפחות בתוך 6 השעות הראשונות לאחר ההמלטה.

בכדי להשיג תוצאות מיטביות יש לאמץ מדיניות חיסונים לכל העדר.

הנהלת המשק צריכה לשאוף להפחתת החשיפה ל-*C. parvum*.

מתן באזור החיץ בין הנקבים הביא לתגובות גרנולומטיות כרוניות מקומיות כואבות בקוטר של עד 15 ס"מ ולהיווצרות מורסה (מספר רב של מורסות קטנות בקוטר של עד 1 ס"מ בנתיחה שלאחר המוות 15 שבועות לאחר החיסון הראשון ו- 11 שבועות לאחר חיסון שני), באחת משתי נתיחות של פרות (המחקר כלל 9 פרות).

מתן בכפל הצוואר עלול לעורר תגובות דלקתיות כרוניות נרחבות בקוטר של עד 30 ס"מ אשר עלולות להוביל לתגובות מקומיות כואבות עם השפעה מתמשכת אפשרית על רווחת הפרה.

אזהרות מיוחדות עבור האדם המחסן:

למשתמש:

מוצר וטרינרי רפואי זה מכיל שמן מינרלי. הזרקה בשוגג/הזרקה עצמית עלולה לגרום לכאבים ולנפיחות חמורים, במיוחד אם מוזרקם למפרק או לאצבע, ובמקרים נדירים עלולה לגרום לאובדן האצבע המושפעת אם לא ניתן טיפול רפואי מיידי. אם הוזרק לך בטעות מוצר וטרינרי רפואי זה, פנה לייעוץ רפואי מיידי, גם אם הוזרקה רק כמות קטנה מאוד וקח איתך את העלון. אם הכאב נמשך יותר מ-12 שעות לאחר בדיקה רפואית, פנה שוב לייעוץ רפואי.

לרופא:

מוצר וטרינרי רפואי זה מכיל שמן מינרלי. גם אם הוזרקו כמויות קטנות, הזרקה בשוגג עם מוצר זה עלולה לגרום לנפיחות עזה אשר עלולה, למשל, לגרום לנמק איסכמי ואף לאובדן אצבע. נדרש טיפול כירורגי מהיר של מומחה, העלול לכלול חיתוך ושטיפה של האזור המוזרק, במיוחד כאשר יש מעורבות של כרית האצבע או גיד.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה:

אזהרות ואמצעים להפחתת סיכון סביבתי: כל שארית תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

הריון והנקה:

מוצר וטרינרי רפואי זה מיועד לשימוש בשליש השלישי של ההריון.

תגובות בין תרופתיות:

קיימים נתוני בטיחות ויעילות המוכיחים שניתן לתת תרכיב זה באותו יום אך לא מעורבב עם Bovilis Rotavec Corona. יש לתת את החיסונים באיזורי הזרקה שונים. יש לעיין בספרות המוצר של Bovilis Rotavec Corona לפני המתן. יש להתחשב בדרכי המתן השונות. אין מידע זמין על הבטיחות והיעילות של חיסון זה בשימוש עם כל מוצר וטרינרי רפואי אחר מלבד המוצר שהוזכר לעיל. לכן, ההחלטה להשתמש בחיסון זה לפני או אחרי כל מוצר וטרינרי רפואי אחר, צריכה להיעשות על בסיס כל מקרה לגופו.

מתן יתר:

לאחר מתן מינון יתר, לא מתרחשות תגובות לוואי מלבד אלו המוזכרות בסעיף 'תופעות לוואי'.

אי התאמות עיקריות:

אין לערבב עם כל מוצר וטרינרי רפואי אחר.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת האריזה:

בקבוקון זכוכית Type I המכיל 2 מ"ל או 10 מ"ל, סגור בפקק גומי וסוגר אלומיניום.
בקבוקון PET (polyethylene terephthalate) המכיל 10 מ"ל, 40 מ"ל או 100 מ"ל, סגור בפקק גומי וסוגר אלומיניום.
קופסת קרטון המכילה: 10 בקבוקונים 2 X מ"ל (10 X 1 מנה), 1 בקבוקון 10 X מ"ל (5 מנות), 1 בקבוקון 40 X מ"ל (20 מנות), 1 בקבוקון 100 X מ"ל (50 מנות).

ייתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.

שם היצרן וכתובתו:

Intervet International B.V., Wim de Koeistraat 35, 5831AN, Boxmeer, the Netherlands

שם בעל הרישום וכתובתו:

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.
טל: 09-9533375.

עלון בשפה העברית נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך : 12.2025

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

הינו : 2-324-07-15