

פורסיליס פי.סי.וי. אמ היו

Porcilis® PCV M Hyo

תחליב להזרקה

הרכב:

במנה של 2 מ"ל תרכיב:

חומר פעיל:

<i>Porcine circovirus type 2 (PCV2) ORF2 subunit antigen</i>	$\geq 2828 \text{ AU}^1$
<i>Mycoplasma hyopneumoniae J strain inactivated</i>	$\geq 2.69 \text{ RPU}^2$

אדג'ובנט :

Light mineral oil	0.268 ml
Aluminium (as hydroxide)	2.0 mg

¹ Antigenic units as determined in the *in vitro* potency test (ELISA).
² Relative potency units defined against a reference vaccine.

מין מטרה:

חזירים לפיטום.

מינון דרך ואופן מתן, הנחיות לשימוש נכון:

תרכיב להזרקה תוך שרירית בצוואר בחזירים.

לפני השימוש בתרכיב יש לאפשר לו להגיע לטמפרטורת חדר) 15°C-25°C (ולנער היטב לפני השימוש. הימנע מהחדרת זיהום למוצר.

תוכנית חיסון עם מנה אחת:

מנת תרכיב אחת של 2 מ"ל בחזירים החל מגיל 3 שבועות.

תוכנית חיסון עם שתי מנות:

2 מנות תרכיב של 1 מ"ל בחזירים החל מגיל 3 ימים עם הפרש של לפחות 18 ימים.

יש להתאים את אורך וקוטר המחט לגיל החיה.

כאשר מתרחשים זיהומים מוקדמים ב- PCV2 ו/או *M. hyopneumoniae*, מומלצת תוכנית החיסון עם שתי מנות.

התוויות :

חיסון פעיל בחזירים להפחתת הוירמיה הכללית, כמות הנגיפים בריאות וברקמות הלימפה, הפחתת ההפרשה הנגרמת על ידי *circovirus* חזירי מסוג 2 (PCV2) וחומרתם של נגעי ריאות הנגרמים על ידי זיהום ב- *Mycoplasma hyopneumoniae*. להפחתת האובדן בעלייה היומית במשקל בסוף תקופת הפיטום בעקבות זיהומים ב- *Mycoplasma hyopneumoniae* ו/או (PCV2) כפי שנצפה במחקרי שדה).

תחילת חסינות עם מנת תרכיב אחת:

PCV2: 2 שבועות לאחר חיסון.

M. hyopneumoniae: 4 שבועות לאחר חיסון.

תחילת חסינות עם שתי מנות תרכיב:
PCV2: 18 ימים לאחר החיסון הראשון.
M. hyopneumoniae: 3 שבועות לאחר החיסון השני.

משך החסינות: (בשני הפרוטוקולים-שתי תוכניות החיסון)
PCV2: 22 שבועות לאחר החיסון (עם מנת תרכיב אחת) או לאחר החיסון האחרון (בהתחסנות עם שתי מנות).
M. hyopneumoniae: 21 שבועות לאחר החיסון (עם מנת תרכיב אחת) או לאחר החיסון האחרון (בהתחסנות עם שתי מנות).

התוויות נגד:
אין.

תופעות לוואי:

חזירים (לפיטום):

מאוד שכיח (יותר מבעל חיים אחד מתוך 10 בעלי חיים מטופלים)	עליה בטמפרטורת הגוף ¹
לא שכיח (1-10 בעלי חיים מתוך 1000 בעלי חיים מטופלים)	נפיחות באזור ההזרקה ² ירידה בפעילות ³ נטייה של בעלי החיים לשכב ³ אי נוחות ³
נדיר (1-10 בעלי חיים מתוך 10000 בעלי חיים מטופלים)	תגובת רגישות יתר ⁴
נדיר מאוד (פחות מבעל חיים אחד מתוך 10000 בעלי חיים מטופלים, כולל דיווחים מבודדים)	תגובה מסוג אנפילקטי ⁵

¹ (ביום החיסון) בממוצע $\pm 1^{\circ}\text{C}$, בחזירים בודדים עד 2°C). בעלי החיים יחזרו למצב רגיל 1-2 ימים לאחר טמפרטורת השיא.
² פחות מקוטר 2 סנטימטר. תגובות אלו נעלמות תוך 12 ימים לאחר החיסון הראשון מתוך תוכנית החיסון עם שתי מנות ותוך 3 ימים לאחר סיום תוכנית החיסון עם מנה אחת או תוכנית החיסון עם שתי מנות.
³ עד ליום אחד לאחר חיסון.
⁴ לאחר החיסון הראשון מתוך תוכנית חיסון עם שתי מנות.
⁵ לתוכנית החיסון עם מנה אחת. עלול להיות מסכן חיים. אם תגובה כזו מתרחשת, מומלץ טיפול מתאים.

לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים נא ליצור קשר עם חברת אינטרווט בטלפון: 09-9533375.

זמן המתנה:
אפס ימים.

הוראות אחסון:
הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
יש לאחסן במקרר בטמפרטורה של 2°C - 8°C .
אין להקפיא.
יש להגן מפני אור שמש ישיר.
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. חיי מדף
לאחר הפתיחה: יש להשתמש בתוך 8 שעות.

אזהרות מיוחדות לכל מין המטרה:
יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.

אזהרות מיוחדות עבור האדם המחסן:
למשתמש:

תכשיר וטרינרי רפואי זה מכיל שמן מינרלי. הזרקה/הזרקה עצמית בשוגג עלולה לגרום לכאב ונפיחות חמורים, במיוחד אם הזרקה לתוך מפרק או אצבע, במקרים נדירים יכולה לגרום לאיבוד האצבע שנפגעה אם לא ניתן טיפול רפואי מיד. אם במקרה הזרק לך תכשיר וטרינרי רפואי זה, יש לפנות ליעוץ רפואי מיד גם אם הזרקה כמות קטנה מאוד ויש לקחת את עלון האריזה איתך. אם כאב נמשך ליותר מ-12 שעות לאחר הבדיקה הרפואית, יש לפנות ליעוץ רפואי שוב.

לרופא:

מוצר וטרינרי רפואי זה מכיל שמן מינרלי. גם אם הוזרקה כמות קטנה, הזרקה בשוגג עם תכשיר וטרינרי רפואי זה עלולה לגרום לנפיחות משמעותית, אשר עשויה, למשל, לגרום לנמק איסכמי ואפילו לאובדן האצבע. נדרשת תשומת לב מיידי, ממנתח מומחה שעשויה להצריך חיתוך מוקדם ושטיפה של האזור המוזרק, במיוחד כשיש מעורבות של כרית האצבע ו/או גיד.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה:

אזהרות ואמצעים להפחתת סיכון סביבתי: כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

תגובות בין תרופתיות: אין מידע זמין על הבטיחות והיעילות של תרכיב זה בעת שימוש עם כל מוצר וטרינרי רפואי אחר. החלטה להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי כל מוצר וטרינרי רפואי אחר צריכה להיעשות בכל מקרה ומקרה לגופו.

מתן מינון יתר:

אין מידע.

אי התאמות עיקריות:

אין לערבב עם מוצר וטרינרי רפואי אחר.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת אריזה:

קופסת קרטון המכילה 1 או 10 בקבוקונים מסוג PET של 20, 50, 100, 200 או 500 מ"ל. לא כל גדלי האריזות משווקים.

מידע נוסף:

התרכיב משרה חיסון פעיל בחזירים כנגד circovirus חזירי מסוג 2 ו- *Mycoplasma hyopneumoniae*.

שם וכתובת היצרן:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

שם וכתובת בעל הרישום:

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 08.2025

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגו: 4-252-07-15