

Nobivac® Puppy DP PLUS

נוביווק® פאפי די פי פלוס

אבקה מיובשת בהקפאה וממס להכנת תרחיף להזרקה

כל מנה (1 מ"ל) מכילה:

Live attenuated *canine distemper virus* strain *Onderstepoort*: $10^{5.1} - 10^{6.5}$ TCID₅₀

Live recombinant *canine parvovirus* strain *630a*: $10^{5.1} - 10^{6.7}$ TCID₅₀

מין מטרה: כלבים (גורי כלבים).

דרך מתן: תת עורי.

קופסת פלסטיק המכילה 5 בקבוקוני זכוכית של מנה אחת של תרכיב ו-5 בקבוקוני זכוכית של 1 מ"ל ממס בהתאמה.

1 X 5 מנה

Nobivac® Puppy DP PLUS

נוביווק® פאפי די פי פלוס

אבקה מיובשת בהקפאה וממס להכנת תרחיף להזרקה עבור כלבים (גורי כלבים).

הרכב:

כל מנה (1 מ"ל) של תרכיב לאחר המסה מכילה:

Live attenuated *canine distemper virus* strain *Onderstepoort*: $10^{5.1} - 10^{6.5}$ TCID₅₀*

Live recombinant *canine parvovirus* strain *630a*: $10^{5.1} - 10^{6.7}$ TCID₅₀*

* Tissue culture infective dose 50%

מין מטרה:

כלבים (גורי כלבים).

מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה/שימוש נכון בתרכיב:

יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) תת עורית לגורי כלבים מגיל 4 שבועות, לאחר המסת התרכיב עם הממס Solvent for Nobivac® Puppy DP PLUS המצורף באריזה.

יש לוודא כי כל האבקה המיובשת בהקפאה הומסה לחלוטין לפני השימוש. יש לתת את כל תכולת הבקבוקון.

התוויות:

לחיסון פעיל של גורי כלבים מגיל 4 שבועות למניעת סימנים קליניים ותמותה כתוצאה מהדבקה בנגיף *canine distemper* (כלבלבת) ובנגיף *canine parvovirus* ולמניעת הפרשה ויראלית בעקבות ההדבקה בנגיף *canine distemper* ו-*canine parvovirus*.

תחילת החסינות: 7 ימים ל-*canine distemper virus* ו-3 ימים ל-*canine parvovirus*. משך החסינות: 8 שבועות.

התוויות נגד:

אין.

תופעות לוואי:

כלבים:

נפיחות באזור ההזרקה. ¹	מאוד שכיח (< 1 בעלי חיים / 10 בעלי חיים מטופלים)
ירידה בפעילות. ²	נדיר (1 עד 10 בעלי חיים / 10.000 בעלי חיים מטופלים)
תגובה רגישות יתר. ³	נדיר מאוד (> 1 בעל חיים / 10.000 בעלי חיים מטופלים)

¹ קטנה, ללא כאבים (קוטר > 1 ס"מ) במהלך השבוע הראשון לאחר בחיסון. הנפיחות תיעלם לחלוטין תוך מספר ימים.

² במהלך 4 שעות לאחר החיסון.

³ כולל אנפילקסיס (לעתים קטלני). אם מתרחשת תגובה כזו, יש לתת טיפול מתאים ללא דיחוי.

לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים יש לפנות לחברת אינטרווט בטלפון: 09-9533375.

זמן המתנה:

לא רלוונטי.

הוראות אחסון:

יש להרחיק מהישג ידם וראייתם של ילדים.

יש לאחסן במקרר (2°C-8°C). אין לשנע מעל 30°C.

אין להקפיא. יש להגן מפני אור.

לאחר ההמסה, יש להשתמש בתרכיב המוכן תוך 30 דקות.
אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אזהרות מיוחדות:

אזהרות מיוחדות לכל מין מטרה:

יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.
רמות בינוניות עד גבוהות של נוגדנים אימהיים כנגד נגיף *canine distemper* עלולות להפחית את יעילות התכשיר כנגד מחלת *canine distemper*.
בדרך כלל מומלץ כי כל גור יחוסן בתרכיב זה בגיל 6 שבועות. במקרים שיש סיכון גבוה להידבקות בנגיף *canine parvovirus* ו/או נגיף *canine distemper* מומלץ לחסן גורים מוקדם יותר, אך לא לפני גיל 4 שבועות.
בחלק מהגורים, זן *canine parvovirus* של התרכיב עלול להימצא בצואה עד 8 ימים לאחר החיסון. לעיתים זן התרכיב עלול להיות מופץ לכלבים וחתולים אחרים, אך אינו גורם לסימני מחלה. בחתולים, עלולה להיות הפרשה של זן התרכיב בצואה עד 5 ימים והפצה לחתולים אחרים ללא ביטוי סימני מחלה. נגיף *canine distemper* אינו מופץ על ידי גורים מחוסנים.

אזהרות מיוחדות עבור האדם המחסן:

במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, יש לפנות מיד לקבלת ייעוץ רפואי ולהציג את העלון המצורף לאריזה או את התווית לרופא.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה:

כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

שימוש בזמן הריון או הנקה:

בטיחות התרכיב במהלך הריון לא נבדקה.

תגובות בין תרופתיות:

קיימים נתוני בטיחות המעידים כי תרכיב זה יכול להינתן באותו היום, אבל לא מעורבב, עם תרכיב מסדרת נוביווק המכיל *canine parainfluenza virus*-*bordetella bronchiseptica* במתן לתוך האף (Nobivac KC). היעילות לאחר שימוש בו-זמנית טרם נבדקה. לכן, למרות שהודגמה בטיחות בשימוש בו-זמנית, על הווטרינר לקחת זאת בחשבון כאשר הוא מחליט לתת תכשירים אלו באותו הזמן.
לא קיים מידע על הבטיחות והיעילות של תרכיב זה כאשר הוא ניתן עם כל תכשיר רפואי ווטרינרי אחר למעט זה שצוין לעיל. לאור זאת, יש לקבל החלטה האם להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי כל תכשיר רפואי ווטרינרי אחר על בסיס כל מקרה לגופו.

מתן יתר:

לא נצפו תופעות לוואי לאחר מתן התרכיב במינון יתר של פי 10 למעט אלו שצוינו בסעיף תופעות לוואי.

אי התאמות עיקריות:

אין לערבב את התרכיב עם תכשיר רפואי וטרינרי אחר, למעט הממס המסופק יחד עם התרכיב באותה האריזה.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת אריזה:

קופסת פלסטיק המכילה 5 או 25 בקבוקוני זכוכית של מנה אחת של תרכיב ו-5 או 25 בקבוקוני זכוכית המכילים 1 מ"ל ממס בהתאמה.
לא כל גדלי האריזה משווקים.

מידע נוסף:

נוגדנים אימהיים כנגד *canine parvovirus* אינם מפריעים ליעילות התרכיב. החסינות כנגד *canine distemper virus* מושגת בגורים בני 4 שבועות בעלי רמות נמוכות עד בינוניות של נוגדנים אימהיים.

שם היצרן וכתובתו:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

שם בעל הרישום וכתובתו:

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 4527701.
טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 06.2026
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: 6-311-07-15